

国際共同第Ⅲ相試験 (ONO-4538-12試験)



薬価基準収載

抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗ヒトPD-1モノクローナル抗体

オプジーザ[®]点滴静注

20mg, 100mg, 120mg, 240mg

ニボルマブ(遺伝子組換え)製剤

生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品^注注)注意—医師等の処方箋により使用すること**OPDIVO[®]**
(nivolumab)

1. 警 告

- 1.1 本剤は、緊急時に十分対応できる医療施設において、がん化学療法に十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本剤の使用が適切と判断される症例についてのみ投与すること。また、治療開始に先立ち、患者又はその家族に有効性及び危険性を十分説明し、同意を得てから投与すること。
- 1.2 間質性肺疾患があらわれ、死亡に至った症例も報告されているので、初期症状(息切れ、呼吸困難、咳嗽、疲労等)の確認及び胸部X線検査の実施等、観察を十分に行うこと。また、異常が認められた場合には本剤の投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。[8.2、9.1.2、11.1.1参照]

2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

製造販売

小野薬品工業株式会社

プロモーション提携

ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社

本試験におけるオプジーボの用法及び用量は、現在承認されている用法及び用量と異なります。

国際共同第Ⅲ相試験(ONO-4538-12試験)^{50,51)}

目的 2つ以上の化学療法歴を有する標準治療に不応又は不耐の治癒切除不能な進行・再発の胃癌又は食道胃接合部癌(腫瘍の中心が食道胃接合部より上下5cm以内に位置する腺癌)を対象に、オプジーボ群のプラセボ群に対する優越性を検証するとともに、安全性も検討する。

試験デザイン 多施設共同プラセボ対照二重盲検無作為化比較第Ⅲ相試験[優越性試験]

対象 2つ以上の化学療法歴を有する標準治療に不応又は不耐の治癒切除不能な進行・再発の胃癌又は食道胃接合部癌(腫瘍の中心が食道胃接合部より上下5cm以内に位置する腺癌)患者 493例(日本人226例)[オプジーボ群:330例(日本人152例)、プラセボ群:163例(日本人74例)]

投与方法 オプジーボ群:オプジーボ3mg/kgを1日1回、2週間間隔で点滴静注し、6週を1サイクルとした。
プラセボ群:生理食塩液を2週間間隔で点滴静注した。

評価項目 **有効性** 主要評価項目:全生存期間(OS)

副次的評価項目:無増悪生存期間(PFS) [RECISTガイドライン1.1版に基づく試験実施施設の医師判定]、奏効率(ORR) [RECISTガイドライン1.1版に基づく試験実施施設の医師判定]、奏効期間(DOR) [RECISTガイドライン1.1版に基づく試験実施施設の医師判定]、病勢制御率(DCR) [RECISTガイドライン1.1版に基づく試験実施施設の医師判定]、奏効に至るまでの期間(TTR) [RECISTガイドライン1.1版に基づく試験実施施設の医師判定]、最良総合効果(BOR) [RECISTガイドライン1.1版に基づく試験実施施設の医師判定]、標的病変の腫瘍径の変化率

安全性 有害事象、臨床検査等

その他 薬物動態、抗薬物抗体

バイオマーカー探索:ヒト白血球型抗原(HLA)検査、血漿中マイクロRNA発現解析、末梢血単核球(PBMC)等

解析計画

有効性 主要評価項目:全生存期間(OS)は、必要イベント数261件の約75%のイベント(196件)が発生した時点で、事前の計画に従って中間解析を実施し、再算定後の必要イベント328件が発生した時点で最終解析を実施した。割付因子を層別因子(実施国、ECOG PS、転移臓器数)とした層別log-rank検定(片側有意水準2.5%)により投与群間の比較を行った。さらに、主たる解析の感度分析として、log-rank検定による投与群間の比較を行った。割付因子を層別因子とした層別Cox比例ハザードモデルを用いて、オプジーボ群のプラセボ群に対するハザード比及びその両側95%信頼区間を算出した。Kaplan-Meier法を用いて中央値及びその両側95%信頼区間と、3、6、9、12及び18ヵ月時点の生存率及びその両側95%信頼区間を投与群ごとに算出した。

副次的評価項目:無増悪生存期間(PFS)は、割付因子を層別因子とした層別log-rank検定(片側有意水準2.5%)により投与群間の比較を行った。割付因子を層別因子とした層別Cox比例ハザードモデルを用いて、オプジーボ群のプラセボ群に対するハザード比及びその両側95%信頼区間を算出した。Kaplan-Meier法を用いて中央値及びその両側95%信頼区間と、3、6、9、12及び18ヵ月時点のPFS率及びその両側95%信頼区間を投与群ごとに算出した。奏効率(ORR)及び病勢制御率(DCR:CR+PR+SD)に対して、割合及びその両側95%信頼区間(Clopper-Pearson法)を投与群ごとに算出した。割付因子を層別因子としたCochran-Mantel-Haenszel(CMH)検定により投与群間の比較を行った。割付因子を層別因子としたCMH法を用いて、オプジーボ群のプラセボ群に対するオッズ比及びその両側95%信頼区間、並びにリスク差及びその両側95%信頼区間を算出した。最良総合効果(BOR) [完全奏効(CR)、部分奏効(PR)、安定(SD)、進行(PD)、評価不能(NE)]の割合及びその両側95%信頼区間(Clopper-Pearson法)を投与群ごとに算出した。奏効期間(DOR)について、Kaplan-Meier曲線を投与群ごとに表示した。またBORがCR又はPRの症例を対象に、Kaplan-Meier法を用いて中央値及びその両側95%信頼区間を投与群ごとに算出した。奏効に至るまでの期間(TTR)は、Kaplan-Meier曲線を投与群ごとに表示し、要約統計量を投与群ごとに算出した。標的病変の腫瘍径の変化率に対して、waterfall plotを作成した。


サブグループ解析:解析計画の有効性で設定された評価項目において規定された日本人部分集団を対象としたサブグループ解析を行った。また、事前に規定された実施国、年齢、性別、PS、再発の有無、病変の部位、組織型、肉眼型、転移臓器の数、腹膜転移の有無、肝転移の有無、標的病変の有無、前治療(手術・放射線療法)の有無及び前治療レジメン数を層別因子とし、OSのサブグループ解析を行った。

50)小野薬品工業：国際共同第Ⅲ相(ONO-4538-12)試験成績(社内資料) 承認時評価資料

51)Kang Y-K. et al.: Lancet., 390: 2461, 2017.

[利益相反]本試験は、Bristol-Myers Squibbの資金提供、及び小野薬品工業からの支援をうけて実施された。

試験デザイン




ECOG:Eastern Cooperative Oncology Group

※:進行が確認された後も、治験実施計画書に規定する状況下で投与を継続できる。

有効性 主要評価項目: 全生存期間(OS)**副次的評価項目:** 無増悪生存期間(PFS)、奏効率(ORR)、奏効期間(DOR)、病勢制御率(DCR)、奏効に至るまでの期間(TTR)、最良総合効果(BOR)、標的病変の腫瘍径の変化率**安全性 有害事象、臨床検査等****その他 薬物動態、抗薬物抗体**

バイオマーカー探索：ヒト白血球型抗原(HLA)検査、血漿中マイクロRNA発現解析、末梢血単核球(PBMC)等

投与方法



4. 効能又は効果(一部抜粋)
治癒切除不能な進行・再発の胃癌

6. 用法及び用量(一部抜粋)
(治癒切除不能な進行・再発の胃癌)
通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。
他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合は、通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回360mgを3週間間隔で点滴静注する。
7. 用法及び用量に関する注意(一部抜粋)
(効能共通)
7.1 本剤は、30分以上かけて点滴静注すること。

患者背景(全症例)

		オプジーボ群(330例)	プラセボ群(163例)
性別	男性	229(69.4%)	119(73.0%)
	女性	101(30.6%)	44(27.0%)
年齢	<65歳	189(57.3%)	95(58.3%)
	≥65歳	141(42.7%)	68(41.7%)
	<75歳	300(90.9%)	149(91.4%)
	≥75歳	30(9.1%)	14(8.6%)
	平均(SD)	60.7歳(11.4)	59.9歳(11.9)
	中央値	62.0歳	61.0歳
	最小値～最大値	20～83歳	26～83歳
人種	アジア人	329(99.7%)	163(100.0%)
	ハワイ先住民又は他の太平洋諸島系	1(0.3%)	0
ECOG PS (IWRS source)	0	95(28.8%)	48(29.4%)
	1	235(71.2%)	115(70.6%)
再発の有無	なし	194(58.8%)	91(55.8%)
	あり	136(41.2%)	72(44.2%)
転移部位(初診時)	リンパ節	285(86.4%)	138(84.7%)
	腹膜	63(19.1%)	42(25.8%)
	肝	78(23.6%)	28(17.2%)
	肺	18(5.5%)	6(3.7%)
	胸膜	4(1.2%)	2(1.2%)
	副腎	6(1.8%)	4(2.5%)
	骨	6(1.8%)	5(3.1%)
	その他	36(10.9%)	17(10.4%)
前治療レジメン数 (術後補助療法を含む)	2	69(20.9%)	29(17.8%)
	3	137(41.5%)	62(38.0%)
	≥4	124(37.6%)	72(44.2%)
	平均(SD)	3.4(1.1)	3.5(1.1)
	中央値	3.0	3.0
	最小値～最大値	2～9	2～7
手術歴	なし	117(35.5%)	51(31.3%)
	あり	213(64.5%)	112(68.7%)
放射線療法歴	なし	289(87.6%)	138(84.7%)
	あり	41(12.4%)	25(15.3%)


IWRS:interactive web response system

有効性

●全生存期間(OS) [主要評価項目]

全生存期間(OS)について、オプジー ボ群のプラセボ群に対する優越性が統計学的に検証されました($p<0.0001$ 片側有意水準0.025、層別log-rank検定^{※1})。OS中央値はオプジー ボ群で5.26ヵ月(95%信頼区間[4.60, 6.37]^{※2})、プラセボ群で4.14ヵ月(95%信頼区間[3.42, 4.86]^{※2})であり、オプジー ボ群のプラセボ群に対するハザード比は0.63(95%信頼区間[0.51, 0.78]^{※3})でした。

OSのKaplan-Meier曲線(全症例)



※1:IWRSのデータに基づく割付因子(実施国、ECOG PS、転移臓器数)を層別因子とした

※2:Kaplan-Meier法

※3:IWRSのデータに基づく割付因子(実施国、ECOG PS、転移臓器数)を層別因子としたCox比例ハザードモデル

6. 用法及び用量(一部抜粋)

〈治癒切除不能な進行・再発の胃癌〉

通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。

他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合は、通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回360mgを3週間間隔で点滴静注する。

7. 用法及び用量に関連する注意(一部抜粋)


〈効能共通〉

7.1 本剤は、30分以上かけて点滴静注すること。

●無増悪生存期間(PFS) [医師判定] [副次的評価項目]

無増悪生存期間(PFS)について、オプジーコーパ群のプラセボ群に対する統計学的に有意な延長が認められました($p<0.0001$ 片側:有意水準0.025、層別log-rank検定^{※1})。PFS中央値は、オプジーコーパ群で1.61ヶ月(95%信頼区間[1.54, 2.30]^{※2})、プラセボ群で1.45ヶ月(95%信頼区間[1.45, 1.54]^{※2})であり、オプジーコーパ群のプラセボ群に対するハザード比は0.60(95%信頼区間[0.49, 0.75]^{※3})でした。なお、抗腫瘍効果は担当医師がRECISTガイドライン1.1版に従い判定しました。

PFSのKaplan-Meier曲線(全症例)



※1:IWRSのデータに基づく割付因子(実施国、ECOG PS、転移臓器数)を層別因子とした

※2:Kaplan-Meier法

※3:IWRSのデータに基づく割付因子(実施国、ECOG PS、転移臓器数)を層別因子としたCox比例ハザードモデル

●奏効率(ORR) [医師判定] 及び病勢制御率(DCR) [医師判定] [副次的評価項目]

奏効率(ORR:CR+PR)はオプジーコーパ群で11.2%(30/268例、95%信頼区間[7.7, 15.6]^{※4})、プラセボ群で0%(0/131例、95%信頼区間[0.0, 2.8]^{※4})でした($p<0.0001$ 、層別Cochran-Mantel-Haenszel検定^{※5})。また、病勢制御率(DCR:CR+PR+SD)はオプジーコーパ群で40.3%(108/268例、95%信頼区間[34.4, 46.4]^{※4})、プラセボ群で25.2%(33/131例、95%信頼区間[18.0, 33.5]^{※4})でした($p=0.0036$ 、層別Cochran-Mantel-Haenszel検定^{※5})。なお、抗腫瘍効果は担当医師がRECISTガイドライン1.1版に従い判定しました。

※4:Clopper-Pearson法

※5:割付因子(実施国、ECOG PS、転移臓器数)を層別因子としたCochran-Mantel-Haenszel検定

・最良総合効果(BOR) [医師判定] [副次的評価項目]

最良総合効果(BOR)は下表の通りでした。なお、抗腫瘍効果は担当医師がRECISTガイドライン1.1版に従い判定しました。


	CR	PR	SD	PD	NE
オプジーコーパ群(268例)	0	30(11.2%)	78(29.1%)	124(46.3%)	36(13.4%)
プラセボ群(131例)	0	0	33(25.2%)	79(60.3%)	19(14.5%)

例数(%) 解析対象:評価可能症例

●奏効に至るまでの期間(TTR)【医師判定】〔副次的評価項目〕

奏効が認められたオプジー ボ群30/268例において、奏効に至るまでの期間(TTR)の中央値(最小値～最大値)は、1.61ヶ月(1.4～7.0)でした。なお、抗腫瘍効果は担当医師がRECISTガイドライン1.1版に従い判定しました。

● TTRのKaplan-Meier曲線(確定CR又はPRの症例)



6. 用法及び用量(一部抜粋)

〈治癒切除不能な進行・再発の胃癌〉

通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。

他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合は、通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回360mgを3週間間隔で点滴静注する。

7. 用法及び用量に関する注意(一部抜粋)


〈効能共通〉

7.1 本剤は、30分以上かけて点滴静注すること。

●奏効期間(DOR) [医師判定] [副次的評価項目]

奏効が認められたオプジーボ群30/268例において、奏効期間(DOR)の中央値(最小値～最大値)は、9.53ヵ月(6.14～9.82)でした。なお、抗腫瘍効果は担当医師がRECISTガイドライン1.1版に従い判定しました。

 DORのKaplan-Meier曲線(確定CR又はPRの症例)



6. 用法及び用量(一部抜粋)

〈治癒切除不能な進行・再発の胃癌〉

通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。
他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合は、通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回360mgを3週間間隔で点滴静注する。

7. 用法及び用量に関する注意(一部抜粋)

〈効能共通〉

7.1 本剤は、30分以上かけて点滴静注すること。

●全生存期間(OS)(全症例) [主要評価項目・サブグループ解析]

全生存期間(OS)のサブグループ解析は以下の通りでした。

OSのサブグループ解析(全症例)

項目	オプジーボ群 イベント数/例数	プラセボ群 イベント数/例数	ハザード比 [95%信頼区間]*
全体	226/330	141/163	0.65[0.53, 0.80]
実施国			
日本	107/152	63/74	0.63[0.46, 0.85]
韓国	96/146	63/74	0.72[0.52, 0.98]
台湾	23/32	15/15	0.46[0.23, 0.92]
年齢区分			
65歳未満	138/189	83/95	0.76[0.58, 1.00]
65歳以上	88/141	58/68	0.53[0.38, 0.74]
性別			
男性	152/229	104/119	0.59[0.46, 0.75]
女性	74/101	37/44	0.83[0.56, 1.23]
ECOG PS			
0	63/95	43/48	0.59[0.40, 0.87]
1	163/235	98/115	0.68[0.53, 0.87]
再発の有無			
なし	145/194	79/91	0.74[0.56, 0.98]
あり	81/136	62/72	0.53[0.38, 0.74]
病変の部位(TNM分類)			
胃(胃底部、胃体部、胃前庭部及び幽門)	193/272	115/135	0.69[0.55, 0.87]
食道胃接合部	16/30	11/12	0.44[0.20, 0.97]
不明	17/28	15/16	0.59[0.29, 1.19]
組織型(Lauren分類)			
腸型	76/120	48/55	0.59[0.41, 0.85]
びまん型	75/106	51/63	0.82[0.57, 1.17]
その他	12/17	6/6	0.37[0.13, 1.04]
不明	63/87	36/39	0.57[0.38, 0.87]
肉眼型(Borrmann分類)			
早期癌	2/7	1/1	
進行I型	8/13	3/4	0.63[0.17, 2.39]
進行II型	38/59	34/38	0.49[0.31, 0.79]
進行III型	99/141	54/62	0.84[0.61, 1.18]
進行IV型	37/50	20/27	0.78[0.45, 1.35]
不明	42/60	29/31	0.46[0.28, 0.74]
転移臓器の数			
2未満	53/84	34/44	0.70[0.46, 1.08]
2以上	173/246	107/119	0.62[0.49, 0.79]
腹膜転移			
なし	178/267	105/121	0.64[0.50, 0.82]
あり	48/63	36/42	0.74[0.48, 1.15]
肝転移			
なし	168/252	115/135	0.64[0.50, 0.81]
あり	58/78	26/28	0.67[0.42, 1.07]
標的病変			
なし	43/62	26/32	0.70[0.43, 1.14]
あり	183/268	115/131	0.64[0.51, 0.81]
前治療(手術)			
なし	87/117	46/51	0.67[0.47, 0.96]
あり	139/213	95/112	0.63[0.49, 0.82]
前治療(放射線療法)			
なし	199/289	118/138	0.69[0.55, 0.87]
あり	27/41	23/25	0.45[0.26, 0.80]
前治療レジメン数(術後補助療法を含む)			
2	47/69	24/29	0.82[0.50, 1.35]
3	98/137	51/62	0.89[0.63, 1.25]
4以上	81/124	66/72	0.44[0.31, 0.61]



*:非層別Cox比例ハザードモデル ハザード比及びその95%信頼区間は、各治療群の症例数が10人未満のサブセットについては算出しない

安全性(全症例)

臨床検査値異常変動を含む副作用はオプジーボ群で42.7%(141/330例)、プラセボ群で26.7%(43/161例)に認められました。

主な副作用(5%以上)は、オプジーボ群では、そう痒症9.1%(30例)、下痢7.0%(23例)、発疹5.8%(19例)、疲労5.5%(18例)で、プラセボ群では、そう痒症及び疲労各5.6%(9例)でした。

重篤な副作用はオプジーボ群10.0%(33例)、プラセボ群5.0%(8例)に認められ、主なもの(2例以上)はオプジーボ群では、間質性肺疾患0.9%(3例)、大腸炎、発熱、肺炎、尿路感染及び糖尿病性ケトアシドーシス各0.6%(2例)でした。プラセボ群では、2例以上に認められた重篤な副作用はありませんでした。

投与中止に至った副作用は、オプジーボ群2.7%(9例)、プラセボ群2.5%(4例)に認められ、主なもの(2例以上)はオプジーボ群の間質性肺疾患0.9%(3例)でした。プラセボ群では2例以上に認められた投与中止に至った副作用はありませんでした。死亡に至った副作用は、オプジーボ群では心停止、死亡、急性肝炎*、肺炎及び労作性呼吸困難が各0.3%(1例)、プラセボ群では消化管穿孔及び突然死が各0.6%(1例)でした。(承認時)

*:急性肝炎の1例は基準日(最終投与後28日又は後続のがん治療開始日)以降に転帰が死亡となった。

いづれかの群で5%以上に発現した副作用一覧

	発現例数(%)			
	オプジーボ群		プラセボ群	
	全Grade	Grade 3以上	全Grade	Grade 3以上
胃腸障害				
下痢	23(7.0)	2(0.6)	3(1.9)	
一般・全身障害および投与部位の状態				
疲労	18(5.5)	2(0.6)	9(5.6)	2(1.2)
皮膚および皮下組織障害				
そう痒症	30(9.1)		9(5.6)	
発疹	19(5.8)		5(3.1)	

医師から報告された有害事象名は、MedDRA ver19.0Jを用いて読み替え、GradeはCTCAE v4.0を用いて評価しました。因果関係は、「関連あり」、「関連なし」の2段階で評価され、「関連あり」と判定された場合に、副作用として集計しました。なお、「不明」と判定された場合は副作用として集計しました。また、発現頻度は、最終投与後28日又は最終投与後の後治療開始前のいづれか早い時点までに発現・増悪した副作用を対象に集計しました。

6. 用法及び用量(一部抜粋)

(治癒切除不能な進行・再発の胃癌)

通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。

他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合は、通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回360mgを3週間間隔で点滴静注する。

7. 用法及び用量に関する注意(一部抜粋)

(効能共通)

7.1 本剤は、30分以上かけて点滴静注すること。

安全性(日本人部分集団)

臨床検査値異常変動を含む副作用はオプジー ボ群で55.9%(85/152例)、プラセボ群で30.6%(22/72例)に認められました。

主な副作用(5%以上)は、オプジー ボ群では、そう痒症11.2%(17例)、下痢9.2%(14例)、倦怠感7.9%(12例)、疲労7.2%(11例)、食欲減退6.6%(10例)、恶心及び発疹各5.9%(9例)でした。プラセボ群では、倦怠感8.3%(6例)、疲労及び食欲減退各5.6%(4例)でした。

重篤な副作用はオプジー ボ群で12.5%(19例)、プラセボ群で9.7%(7例)に認められ、主なもの(2例以上)はオプジー ボ群では間質性肺疾患2.0%(3例)、大腸炎1.3%(2例)でした。プラセボ群では2例以上に認められた重篤な副作用はありませんでした。

投与中止に至った副作用はオプジー ボ群で4.6%(7例)、プラセボ群で5.6%(4例)に認められ、主なもの(2例以上)はオプジー ボ群の間質性肺疾患2.0%(3例)でした。プラセボ群では、2例以上に認められた投与中止に至った副作用はありませんでした。死亡に至った副作用は、オプジー ボ群では心停止及び死亡が各0.7%(1例)、プラセボ群では消化管穿孔が1.4%(1例)でした。(承認時)

いずれかの群で5%以上に発現した副作用一覧

	発現例数(%)			
	オプジー ボ群		プラセボ群	
	全Grade	Grade 3以上	全Grade	Grade 3以上
胃腸障害				
下痢	14(9.2)	2(1.3)	2(2.8)	
恶心	9(5.9)		1(1.4)	
一般・全身障害および投与部位の状態				
倦怠感	12(7.9)		6(8.3)	
疲労	11(7.2)	1(0.7)	4(5.6)	2(2.8)
代謝および栄養障害				
食欲減退	10(6.6)	3(2.0)	4(5.6)	1(1.4)
皮膚および皮下組織障害				
そう痒症	17(11.2)		1(1.4)	
発疹	9(5.9)		2(2.8)	

医師から報告された有害事象名は、MedDRA ver19.0Jを用いて読み替え、GradeはCTCAE v4.0を用いて評価しました。因果関係は、「関連あり」、「関連なし」の2段階で評価され、「関連あり」と判定された場合に、副作用として集計しました。なお、「不明」と判定された場合は副作用として集計しました。また、発現頻度は、最終投与後28日又は最終投与後の後治療開始前のいずれか早い時点までに発現・増悪した副作用を対象に集計しました。

—抗悪性腫瘍剤— ヒト型抗ヒトPD-1モノクローナル抗体 ニボルマブ(遺伝子組換え)製剤

生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品^{注1)}

オプジー[®]ボ点滴静注 20mg・100mg・120mg・240mg

OPDIVO[®] I.V. Infusion

貯 法：2~8℃で保存
有効期間：36箇月

注) 注意－医師等の処方箋により使用すること

日本標準商品分類番号 874291

薬価基準収載

承認番号	販売開始	薬価収載
20mg 22600AMX00768000	2014年9月	2014年9月
100mg 22600AMX00769000		
120mg 30200AMX00925000	2020年11月	2020年11月
240mg 23000AMX00812000	2018年11月	2018年11月

最適使用推進ガイドライン対象品目

和物による治療歴のない患者における本剤の有効性及び安全性は確立していない。

5.14 十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、MSI-Highが確認された患者に投与すること。検査にあたっては、承認された体外診断用医薬品又は医療機器を用いること。なお、承認された体外診断用医薬品又は医療機器に関する情報については、以下のウェブサイトから入手可能である：
<https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/review-information/cd/001.html>

5.15 「17臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、本剤以外の治療の実施についても慎重に検討し、適応患者の選択を行うこと。
[17.1.24参照]

5.16 本剤の術後補助療法における有効性及び安全性は確立していない。
(根治切除不能な進行・再発の食道癌)

5.17 「17臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。
[17.1.25、17.1.26参照]
(食道癌における術後補助療法)

5.18 術前補助療法により病理学的完全奏効(pCR)が認められなかった患者に投与すること。

5.19 本剤の術前補助療法における有効性及び安全性は確立していない。

5.20 臨床試験に組み入れられた患者の前治療歴、pCRの定義等について、「17臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。
[17.1.27参照]
(原発不明癌)

5.21 「原発不明がん診療ガイドライン」(日本臨床腫瘍学会)等の最新の情報を参考に、適切な全身検索及び病理学的検査を実施した上で、原発臓器が不明な上皮性悪性腫瘍と診断され、かつ、腫瘍の局在・組織型等に基づいて推奨される治療法のない患者であることを確認すること。

5.22 「17臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。
[17.1.28参照]
(尿路上皮癌における術後補助療法)

5.23 シスプラチニ等のプラチナ製剤による治療が可能な場合にはこれらの治療を優先すること。

5.24 本剤の有効性は、原発部位により異なる傾向が示唆されている。原発部位ごとの結果について、「17臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、腎孟・尿管癌においては、術前補助療法歴も踏まえ、本剤以外の治療の実施についても慎重に検討し、適応患者の選択を行うこと。
[17.1.29参照]

5.25 臨床試験に組み入れられた患者の病期等について、「17臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。
[17.1.29参照]

5.26 本剤の術前補助療法における有効性及び安全性は確立していない。

注) International Metastatic RCC Database Consortium

1. 警告

- 1 本剤は、緊急時に十分対応できる医療施設において、がん化学療法に十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本剤の使用が適切と判断される症例についてのみ投与すること。また、治療開始に先立ち、患者又はその家族に有効性及び危険性を十分説明し、同意を得てから投与すること。
- 2 間質性肺疾患があらわれ、死亡に至った症例も報告されているので、初期症状（息切れ、呼吸困難、咳嗽、疲労等）の確認及び胸部X線検査の実施等、観察を十分に行うこと。また、異常が認められた場合には本剤の投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。
[8.2、9.1.2、11.1.1参照]

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	オプジー [®] ボ 点滴静注 20mg	オプジー [®] ボ 点滴静注 100mg	オプジー [®] ボ 点滴静注 120mg	オプジー [®] ボ 点滴静注 240mg
有効成分				
含量 / 容量 ^{注2)} (1バイアル中)	20mg/2mL	100mg/10mL	120mg/12mL	240mg/24mL
D-マンニトール	60mg	300mg	360mg	720mg
クエン酸ナトリウム水和物	11.76mg	58.8mg	70.6mg	141mg
塩化ナトリウム	5.84mg	29.2mg	35.0mg	70.1mg
ジエチレントリアミン五酢酸	0.01576mg	0.0788mg	0.0946mg	0.189mg
ボリソルベート80	0.4mg	2mg	2.4mg	4.8mg
pH 調節剤 2成分	適量	適量	適量	適量

注1) 本剤は遺伝子組換え技術により、チャイニーズハムスター卵巣細胞を用いて製造される。

注2) 本品は注射液吸引時の損失を考慮して、過量充填されているので、実充填量は各々 22mg/22mL、105mg/10.5mL、126mg/12.6mL、246mg/24.6mLである。

3.2 製剤の性状

販売名	オプジー [®] ボ 点滴静注20mg	オプジー [®] ボ 点滴静注100mg	オプジー [®] ボ 点滴静注120mg	オプジー [®] ボ 点滴静注240mg
注射剤(バイアル)				
pH	5.5~6.5			
浸透圧比	約1.2 (生理食塩液対比)			
性状	無色～微黄色の澄明又は乳白光を呈する液。微粒子をわずかに認めることがある。			

4. 効能又は効果

- 悪性黒色腫
- 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌
- 根治切除不能又は転移性の腎細胞癌
- 再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫
- 再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌
- 治癒切除不能な進行・再発の胃癌
- 切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫
- がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する結腸・直腸癌
- 根治切除不能な進行・再発の食道癌
- 食道癌における術後補助療法
- 原発不明癌
- 尿路上皮癌における術後補助療法

5. 効能又は効果に関連する注意

〈悪性黒色腫〉

5.1 「17臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。
[17.1.1-17.1.7参照]

〈切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌〉

5.2 臨床試験に組み入れられた患者のEGFR遺伝子変異又はALK融合遺伝子の有無等について、「17臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。
[17.1.9-17.1.11参照]

5.3 本剤の術後補助療法における有効性及び安全性は確立していない。

〈根治切除不能又は転移性の腎細胞癌〉

5.4 化学療法未治療患者に対してイピリムマブ(遺伝子組換え)と併用する場合、IMDC^{注3)}リスク分類がintermediate又はpoorリスクの患者を対象とすること。

5.5 本剤の術後補助療法における有効性及び安全性は確立していない。

5.6 「17臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。
[17.1.12-17.1.14参照]

〈再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫〉

5.7 「17臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。
[17.1.15-17.1.17参照]

〈再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌〉

5.8 プラチナ製剤を含む化学療法による治療歴のない患者に対する本剤の有効性及び安全性は確立していない。

5.9 本剤の術後補助療法における有効性及び安全性は確立していない。

5.10 「17臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。
[17.1.18参照]

〈治癒切除不能な進行・再発の胃癌〉

5.11 本剤の術後補助療法における有効性及び安全性は確立していない。

〈切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫〉

5.12 本剤の手術の補助療法における有効性及び安全性は確立していない。

〈がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する結腸・直腸癌〉

5.13 フッ化ピリミジン系抗悪性腫瘍剤、オキサリプラチン及びイリノテカイン塩酸塩水

6. 用法及び用量

〈悪性黒色腫〉 通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。ただし、悪性黒色腫における術後補助療法の場合は、投与期間は12ヶ月間までとする。

根治切除不能な悪性黒色腫に対してイピリムマブ(遺伝子組換え)と併用する場合は、通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回80mgを3週間間隔で4回点滴静注する。その後、ニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔で点滴静注する。

〈切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌、治癒切除不能な進行・再発の胃癌〉 通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。

他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合は、通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回360mgを3週間間隔で点滴静注する。

〈根治切除不能又は転移性の腎細胞癌〉 通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。

カボザンチニブと併用する場合は、通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。

化学療法未治療の根治切除不能又は転移性の腎細胞癌に対してイピリムマブ(遺伝子組換え)と併用する場合は、通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを3週間間隔で4回点滴静注する。その後、ニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。

〈再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫〉 通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。

通常、小児にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回3mg/kg(体重)を2週間間隔で点滴静注する。なお、体重40kg以上の小児には、ニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注することもできる。

〈再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌、原発不明癌〉 通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。

〈切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫〉 通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。

イピリムマブ(遺伝子組換え)と併用する場合は、通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回360mgを3週間間隔で点滴静注する。

イピリムマブ(遺伝子組換え)と併用する場合は、通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを3週間間隔で4回点滴静注する。その後、ニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。

〈根治切除不能な進行・再発の食道癌〉 通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。

他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合は、通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔、1回360mgを3週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。

〈食道癌における術後補助療法、尿路上皮癌における術後補助療法〉 通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。ただし、投与期間は12ヵ月間までとする。

7. 用法及び用量に関連する注意

〈効能共通〉

7. 1 本剤は、30分以上かけて点滴静注すること。

〈悪性黒色腫〉

7. 2 根治切除不能な悪性黒色腫に対して、イビリムマブ(遺伝子組換え)と併用する場合は、臨床試験に組み入れられた患者の前治療歴等について、「17.臨床成績」の項目の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、併用の必要性について慎重に判断すること。また、イビリムマブ(遺伝子組換え)の上乗せによる延命効果は、PD-L1を発現した腫瘍細胞が占める割合(PD-L1発現率)により異なる傾向が示唆されている。イビリムマブ(遺伝子組換え)との併用投与に際してPD-L1発現率の測定結果が得られ、PD-L1発現率が高いことが確認された患者においては、本剤単独投与の実施についても十分検討した上で、慎重に判断すること。[17.1.6参考] 〈切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌〉

7. 3 化学療法未治療患者に対する本剤単独投与の有効性及び安全性は確立していない。

7. 4 他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合、併用する他の抗悪性腫瘍剤は、「17.臨床成績」の項目の内容を熟知し、臨床試験において検討された患者のPD-L1発現率を考慮した上で選択すること。[17.1.10参考]

〈根治切除不能又は転移性の腫瘍細胞癌〉

7. 5 化学療法未治療患者及びサイトカイン製剤のみの治療歴を有する患者に対する本剤単独投与の有効性及び安全性は確立していない。

〈再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫〉

7. 6 他の抗悪性腫瘍剤との併用について、有効性及び安全性は確立していない。

〈再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌〉

7. 7 他の抗悪性腫瘍剤との併用について、有効性及び安全性は確立していない。

〈治療切除不能な進行・再発の胃癌〉

7. 8 本剤単独投与の一次治療及び二次治療における有効性及び安全性は確立していない。

7. 9 他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合には、HER2陰性の患者に投与すること。

7. 10 他の抗悪性腫瘍剤との併用投与の有効性は、PD-L1発現率(CPS)により異なる傾向が示唆されている。CPSについて、「17.臨床成績」の項目の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、本剤を併用する必要性について慎重に判断すること。[17.1.20参考]

7. 11 他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合、併用する他の抗悪性腫瘍剤は「17.臨床成績」の項目の内容を熟知し選択すること。[17.1.20, 17.1.21参考]

〈切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫〉

7. 12 化学療法未治療患者に対する本剤単独投与の有効性及び安全性は確立していない。

〈根治切除不能な進行・再発の食道癌〉

7. 13 化学療法未治療患者に対する本剤単独投与の有効性及び安全性は確立していない。

7. 14 他の抗悪性腫瘍剤との併用投与の有効性は、PD-L1発現率(TPS)により異なる傾向が示唆されている。TPSについて、「17.臨床成績」の項目の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、本剤を含む併用療法の必要性について慎重に判断すること。[17.1.26参考]

7. 15 他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合、併用する他の抗悪性腫瘍剤は「17.臨床成績」の項目の内容を熟知した上で、選択すること。[17.1.26参考]

〈食道癌における術後補助療法〉

7. 16 他の抗悪性腫瘍剤との併用について、有効性及び安全性は確立していない。

〈原発不明癌〉

7. 17 他の抗悪性腫瘍剤との併用について、有効性及び安全性は確立していない。

〈尿路上皮癌における術後補助療法〉

7. 18 他の抗悪性腫瘍剤との併用について、有効性及び安全性は確立していない。

8. 重要な基本的注意

〈効能共通〉

8. 1 本剤のT細胞活性化作用により、過度の免疫反応に起因すると考えられる様々な疾患や病態があらわれることがある。観察を十分に行い、異常が認められた場合には、過度の免疫反応による副作用の発現を考慮し、適切な鑑別診断を行うこと。過度の免疫反応による副作用が疑われる場合には、副腎皮質ホルモン剤の投与等を考慮すること。また、本剤投与終了後に重篤な副作用があらわれることがあるので、本剤投与終了後も観察を十分に行うこと。

8. 2 12間質性肺疾患があらわれることがあるので、臨床症状(呼吸困難、咳嗽、発熱、肺音の異常(捻髪音)等)の確認及び胸部X線検査の実施等、観察を十分に行うこと。また、必要に応じて胸部CT、血清マーカー等の検査を実施すること。[1.2, 9.1.2, 11.1.1参考]

8. 3 重症筋無力症、心筋炎、筋炎、横紋筋融解症があらわれることがあるので、筋力低下、眼瞼下垂、呼吸困難、嚥下障害、CK上昇、心電図異常、血中及び尿中ミオグロビン上昇等の観察を十分に行うこと。[11.1.2参考]

8. 4 1型糖尿病があらわれることがあるので、口渴、恶心、嘔吐等の症状の発現や血糖値の上昇に十分注意すること。[11.1.4参考]

8. 5 創症肝炎、肝不全、肝機能障害、肝炎、硬化性胆管炎があらわれることがあるので、定期的に肝機能検査を行い、患者の状態を十分に観察すること。[11.1.6参考]

8. 6 甲状腺機能障害、下垂体機能障害及び副腎障害があらわれることがあるので、本剤の投与開始前及び投与期間中は定期的に内分泌機能検査(TSH、遊離T3、遊離T4、ACTH、血中コルチゾール等の測定)を実施すること。また、必要に応じて画像検査等の実施も考慮すること。[11.1.7, 11.1.8, 11.1.11参考]

8. 7 腎障害があらわれることがあるので、定期的に腎機能検査を行い、患者の状態を十分に観察すること。[11.1.10参考]

8. 8 Infusion reactionがあらわれることがあるので、本剤の投与は重度のInfusion reactionに備えて緊急時に十分な対応のできる準備を行った上で開始すること。また、2回目以降の本剤投与時にInfusion reactionがあらわれることもあるので、本剤投与中及び本剤投与終了後はバイタルサインを測定するなど、患者の状態を十分に観察すること。[11.1.15参考]

*8. 9 ぶどう膜炎があらわれることがあるので、眼の異常の有無を定期的に確認すること。また、眼の異常が認められた場合には、速やかに医療機関を受診するよう患者を指導すること。[11.1.20参考]

〈切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌〉

8. 10 本剤とカルボプラチナ、パクリタキセル及びベバシズマブ(遺伝子組換え)を併用投与する際には、発熱性好中球減少症があらわれることがあるので、必要に応じて血液検査を行う等、患者の状態を十分に観察すること。[11.1.5参考]

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9. 1 合併症・既往歴のある患者

9. 1. 1 自己免疫疾患の合併又は慢性的若しくは再発性の自己免疫疾患の既往歴のある患者 自己免疫疾患が増悪するおそれがある。

9. 1. 2 間質性肺疾患のある患者又はその既往歴のある患者 間質性肺疾患が増悪するおそれがある。[1.2, 8.2, 11.1.1参考]

9. 1. 3 臨器移植歴(造血幹細胞移植歴を含む)のある患者 本剤の投与により移植臓器に対する拒絶反応又は移植片対宿主病が発現するおそれがある。

9. 1. 4 結核の感染又は既往を有する患者 結核を発症するおそれがある。[11.1.17参考]

9. 4 生殖能を有する者 妊娠する可能性のある女性には、本剤投与中及び投与終了後一定期間は適切な避妊法を用いるよう指導すること。[9.5参考]

9. 5 妊婦 妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。妊娠サル用いた出生前及び出生後の発生に関する試験において、10mg/kgの週2回投与(AUC比較で臨床曝露量の約6倍に相当する)により妊娠末期における胚・胎児死亡率あるいは出生児死亡率の増加が認められたが、奇形性は認められなかった。また、出生児の成長及び発達に影響は認められなかった。なお、本剤は出生児の血清中で認められている。[9.4参考]

9. 6 授乳婦 治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。本剤のヒト乳汁中への移行は検討されていないが、ヒトIgGは乳汁中に移行するので、本剤も移行する可能性がある。

9. 7 小児等

〈悪性黒色腫、切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌、根治切除不能又は転移性の腫瘍細胞癌、再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌、治療切除不能な進行・再発の胃癌、切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫、がん化学療法後に増悪した治療切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する結腸・直腸癌、根治切除不能な進行・再発の食道癌、食道癌における術後補助療法、原発不明癌、尿路上皮癌における術後補助療法〉

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

〈再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫〉

低出生体重児、新生児又は乳児を対象とした臨床試験は実施していない。

9. 8 高齢者 患者の状態を十分に観察しながら慎重に投与すること。一般に生理機能が低下している。

10. 相互作用

10. 2 併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
生ワクチン 弱毒生ワクチン 不活化ワクチン	接種したワクチンに対する過度な免疫応答に基づく症状が発現した場合には適切な処置を行うこと。	本剤のT細胞活性化作用による過度の免疫反応が起こるおそれがある。

11. 副作用 次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど、適切な処置を行ふこと。

11. 1 重大な副作用

11. 1. 1 間質性肺疾患 肺臓炎、肺浸潤、肺障害等の間質性肺疾患(3.6%、6.2%)があらわれることがあるので、異常が認められた場合には、速やかに胸部X線、胸部CT、血清マーカー等の検査を実施すること。[1.2, 8.2, 9.1.2参考]

11. 1. 2 重症筋無力症(0.1%未満、0.1%未満)、心筋炎(0.2%、0.2%)、筋炎(0.1%未満、0.3%)、横紋筋融解症(頻度不明、0.1%未満)これらを合併したと考えられる症例も報告されている。また、重症筋無力症によるクリーゼのため急速に呼吸不全が進行することがあるので、呼吸状態の悪化に十分注意すること。[8.3参考]

11. 1. 3 大腸炎(1.2%、3.2%)、小腸炎(0.1%未満、0.2%)、重度の下痢(0.8%、3.6%)腸炎から穿孔、イレウスに至る例が報告されている。持続する下痢、腹痛、血便等の症状があらわれた場合には、投与を中止するなど、適切な処置を行ふこと。

11. 1. 4 1型糖尿病 1型糖尿病(劇症1型糖尿病を含む)(0.2%、0.5%)があらわれ、糖尿病性ケトアシドーシスに至ることがある。1型糖尿病が疑わされた場合には投与を中止し、インスリン製剤の投与等の適切な処置を行うこと。[8.4参考]

11. 1. 5 重篤な血液障害 免疫性血小板減少性紫斑病(頻度不明、0.1%未満)、溶血性貧血(頻度不明、0.1%未満)、無顆粒球症(頻度不明、頻度不明)、発熱性好中球減少症(0.1%未満、1.8%)等の重篤な血液障害があらわれることがある。また、本剤とカルボプラチナ、パクリタキセル及びベバシズマブ(遺伝子組換え)との併用において、発熱性好中球減少症(15.8%注)があらわれることがある。[8.10参考]
注1)発現頻度はONO-4538-52試験から集計した。

11. 1. 6 劇症肝炎、肝不全、肝機能障害、肝炎、硬化性胆管炎 劇症肝炎(頻度不明、頻度不明)、肝不全(0.1%未満、0.1%未満)、AST増加、ALT増加、γ-GTP増加、AlP増加、ビリルビン増加等を伴う肝機能障害(0.9%、4.3%)、肝炎(0.3%、1.6%)、硬化性胆管炎(頻度不明、頻度不明)があらわれることがある。[8.5参考]

11. 1. 7 甲状腺機能障害 甲状腺機能低下症(7.6%、12.8%)、甲状腺機能亢進症(3.8%、6.4%)、甲状腺炎(0.9%、1.4%)等の甲状腺機能障害があらわれることがある。[8.6参考]

11. 1. 8 下垂体機能障害 下垂体炎(0.3%、2.0%)、下垂体機能低下症(0.2%、1.0%)、副腎皮質刺激ホルモン欠損症(0.1%未満、0.1%)等の下垂体機能障害があらわれることがある。[8.6参考]

11. 1. 9 神經障害 末梢性ニューロパシー(1.3%、18.8%)、多発ニューロパシー(0.1%未満、0.3%)、自己免疫性ニューロパシー(0.1%未満、頻度不明)、ギラン・バレー症候群(0.1%未満、0.1%未満)、脱髓(0.1%未満、頻度不明)等の神經障害があらわれることがある。

11. 1. 10 腎障害 腎不全(0.6%、2.0%)、尿細管間質性腎炎(0.1%、0.1%)、糸球体腎炎(頻度不明、0.1%未満)等の腎障害があらわれることがある。[8.7参考]

11. 1. 11 副腎障害 副腎機能不全(0.6%、3.1%)等の副腎障害があらわれることがある。[8.6参考]

11. 1. 12 脳炎(0.1%未満、0.2%)

11. 1. 13 重度の皮膚障害 中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis:TEN)(頻度不明、0.1%未満)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)(0.1%未満、0.1%未満)、類天疱瘡(0.1%未満、0.1%未満)、多形紅斑(0.2%、0.4%)等の重度の皮膚障害があらわれることがある。

11. 1. 14 静脈血栓塞栓症 深部静脈血栓症(0.1%未満、0.4%)、肺塞栓症(0.1%未満、0.4%)等の静脈血栓塞栓症があらわれることがある。

11. 1. 15 Infusion reaction アナフィラキシー、発熱、悪寒、そう痒症、発疹、高血圧、低血圧、呼吸困難、過敏症等を含むInfusion reaction(3.2%、7.0%)があらわれることがある。重度のInfusion reactionがあらわれた場合には直ちに投与を中止して適切な処置を行うとともに、全ての徴候及び症状が完全に回復するまで患者の状態を十分に観察すること。[8.8参考]

11. 1. 16 血球貪食症候群(頻度不明、頻度不明)

11. 1. 17 結核(頻度不明、頻度不明) [9.1.4参考]

11.1.18 膜炎(0.3%、0.7%)

11.1.19 重度の胃炎 免疫反応に起因すると考えられる重度の胃炎(頻度不明、頻度不明)があらわれることがある。異常が認められた場合には、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。

*11.1.20 ぶどう膜炎(0.3%、0.3%) [8.9参考]

注)「重大な副作用」の発現頻度は、単独投与時、併用投与時の順に記載した。

11.2 その他の副作用

11.2.1 単独投与

	5%以上	1~5%未満	1%未満	頻度不明
血液及びリンパ系障害	貧血、リンパ球減少症、白血球減少症、血小板減少症、好中球減少症	リンパ節症、赤血球数減少、ヘマトクリット減少、白血球增加症、好中球数増加、单球数增加、好酸球增加、ヘモグロビン減少	单球数減少、好酸球数減少	
* 心臓障害		徐脈、心房細動、心室性期外収縮、頻脈、動悸、伝導障害、不整脈、心電図QT延長	心肥大、心不全、急性心不全、心膜炎	
耳及び迷路障害		回転性めまい、耳不快感、難聴		
内分泌障害	高リバーゼ血症	尿中ブドウ糖陽性、抗甲状腺抗体陽性		
* 眼障害		眼乾燥、硝子体浮遊物、流涙增加、霧視、視力障害、複視、角膜障害	フォークト・小柳・原田病	
胃腸障害	下痢、恶心	腹痛、口内乾燥、口内炎、嘔吐、便秘	消化不良、腹部不快感、腹部膨満、腹水、胃潰瘍、胃炎、十二指腸潰瘍、口の感覺鈍麻、口唇炎、胃食道逆流性疾患、放屁、口腔障害、歯肉出血、歯周病、流涎過多、胃腸障害、口腔知覚不全、消化管出血	
全身障害	疲労(19.7%)、無力感	倦怠感、悪寒、浮腫、粘膜の炎症、発熱、インフルエンザ様疾患	口渴、顔面浮腫、注射部位反応、腫脹、胸部不快感、全身健康状態低下、疼痛、胸痛	
免疫系障害			リウマチ因子増加、抗核抗体増加、補体因子増加、抗リン脂質抗体陽性、サルコイドーシス	
感染症			癰、気管支炎、気道感染、蜂巣炎、爪感染、外耳炎、中耳炎、歯周炎、歯肉炎、鼻咽頭炎、膿疱性皮疹、帶状疱疹、尿路感染、肺感染	
代謝及び栄養障害	食欲減退	高血糖、低ナトリウム血症、高アミラーゼ血症	糖尿病、脱水、高尿酸血症、高カリウム血症、低カリウム血症、低マグネシウム血症、低リン酸血症、低アルブミン血症、高コレステロール血症、高トリグリセリド血症、脂質異常症、血中リン増加、低クロール血症、高マグネシウム血症	代謝性アシドーシス、総蛋白減少
筋骨格系及び結合組織障害	関節痛	筋肉痛	四肢痛、背部痛、筋固縮、筋力低下、側腹部痛、筋骨格硬直、リウマチ性多発筋痛、関節炎、筋骨格痛、関節腫脹、開口障害、筋縮症、シェーゲレン症候群、頸部痛、腱炎、関節硬直	
精神・神経系障害		味覚異常、浮動性めまい、頭痛	不眠症、傾眠、記憶障害、感觉鈍麻、不安、感情障害、リドー減退、うつ病、錯覚	
腎及び尿路障害		高クレアチニン血症	尿中蛋白尿、血尿、血中尿素增加、尿沈渣異常	
呼吸器、胸郭及び縫隔障害		呼吸困難、咳嗽	口腔咽頭痛、肺出血、胸水、しゃべり、喉頭痛、鼻出血、アレルギー性鼻炎、喘鳴、鼻漏、鼻閉、喀血、サーキュレーション不足症候群、皮膚炎、喉頭浮腫、発声障害	
皮膚及び皮下組織障害	そう痒症、発疹	皮膚乾燥、紅斑、ざ瘡様皮膚炎、丘疹性皮疹、湿疹、尋常性白斑、脱毛症、皮膚炎	荨麻疹、中毒性皮疹、乾癬、紫斑、多汗症、寝汗、若齋様角化症、爪の障害、手足症候群、皮膚色素過剩、毛髪変色、皮膚色素減少、皮膚腫瘍、皮膚病変、白斑、酒さ	
血管障害			潮紅、ほてり、高血圧、低血圧、血管炎	
その他		体重減少	硬膜下血腫、真珠腫、気管出血、乳頭痛、細胞マーカー增加、血中CK減少、血中LDH増加、CRP増加、体重増加、血中CK増加、組織球性壞死性リバム炎	

11.2.2 併用投与

	5%以上	1~5%未満	1%未満	頻度不明
血液及びリンパ系障害	好中球減少症(19.5%)、貧血(15.2%)、血小板減少症、白血球減少症	リンパ球減少症	リンパ節症、白血球增加症、好酸球增加症、ヘマトクリット減少、单球增加症、好酸球減少症、好中球増加症、ヘモグロビン減少、赤血球減少症	单球数減少
心臓障害			頻脈、不整脈、心不全、心房細動、徐脈、動悸、心電図QT延長	心肥大、急性心不全、心室性期外収縮、伝導障害
耳及び迷路障害			回転性めまい、難聴、耳鳴、耳不快感	
内分泌障害			性腺機能低下、副甲状腺機能低下症、尿中ブドウ糖陽性	抗甲状腺抗体陽性
* 眼障害		眼乾燥	霧視、視力障害、硝子体浮遊物、複視、角膜障害、上強膜炎、流涙增加、フォークト・小柳・原田病	
胃腸障害	恶心(27.4%)、下痢(26.9%)、嘔吐、便秘、口内炎、腹痛	消化不良、口内乾燥	腹部膨満、腹部不快感、胃炎、放屁、胃腸障害、口腔知覚不全、口腔障害、腹水、腸管穿孔、口唇炎、歯周病、十二指腸炎、十二指腸潰瘍、消化管出血、歯肉出血、口腔内痛、舌痛、痔核、胃食道逆流性疾患、流涎過多、口の感覺鈍麻	胃潰瘍

●その他、詳細は電子添文をご参照ください。

●電子添文の改訂に十分ご留意ください。

全身障害	疲労(21.8%)、発熱、無力症、倦怠感	浮腫、粘膜の炎症、悪寒、インフルエンザ様疾患	顔面浮腫、口渴、疼痛、注射部位反応、腫脹、胸部不快感、全身健康状態低下、胸痛	
免疫系障害			リウマチ因子増加、サルコイドーシス	リウマチ因子陽性、抗核抗体増加、補体因子増加、抗リン脂質抗体陽性、インターロイキン濃度増加
感染症		肺感染		癰、外耳炎
代謝及び栄養障害		高血糖、低ナトリウム血症、脱水、低カリウム血症、低アルブミン血症、低マグネシウム血症、低リソチウム血症、低カルシウム血症	糖尿病、高カリウム血症、高コレステロール血症、高ナトリウム血症、高トリグリセリド血症、高尿酸血症、脂質異常症、低クロール血症、代謝性アシドーシス、高カリウム血症、総蛋白減少	高マグネシウム血症、血中リノ増加
筋骨格系及び結合組織障害	関節痛	関節炎、背部痛、四肢痛、筋痙攣、筋肉痛	筋骨格痛、筋骨格硬直、関節腫脹、頸部痛、脊椎関節障害、側腹部痛、筋固縮、関節硬直、リウマチ性多発筋痛、腱炎、頸骨壊死、開口障害、筋力低下	シェーゲレン症候群
精神・神経系障害	味覚異常	浮動性めまい、錯覚、不眠症、頭痛、感觉鈍麻	失神、不安、うつ病、傾眠、嗜睡、記憶障害、感情障害、リビドー減退、神経炎、錯乱状態、腓骨神経麻痺	
腎及び尿路障害		血中クレアチニン增加、蛋白尿	頻尿、血尿、血中尿素增加、膀胱炎	尿沈渣異常
呼吸器、胸郭及び縫隔障害		咳嗽、呼吸困難、しゃべり、鼻出血、发声障害	肺出血、気道の炎症、胸水、喉頭痛、アレルギー性鼻炎、喘鳴、鼻漏、鼻閉、咯血、低酸素症、サーファクタントプロテイン増加、口腔咽頭痛	喉頭浮腫
皮膚及び皮下組織障害	発疹(18.1%)、そよ痒症(17.1%)、丘疹性皮疹、脱毛症、手足症候群	皮膚炎、皮膚病変、紅斑、ざ瘡様皮膚炎、荨麻疹、皮膚乾燥、皮膚色素過剩	白斑、中毒性皮疹、乾癬、皮膚色素減少、毛髪変色、苔癬様角化症、爪の障害、皮膚腫瘍、紫斑、湿疹、寝汗、多汗症、尋常性白斑	酒さ
血管障害		高血圧	潮紅、ほてり、血管炎、血栓症、低血圧	
その他	体重減少		血中LDH増加、CRP増加、血中CK増加、体重増加、細胞マーカー増加、瘦肉、乳頭痛	血中CK減少、硬膜下血腫、真珠腫、気管出血、組織球性壞死性リバム炎

14. 適用上の注意

14.1 薬剤調製時の注意

14.1.1 バイアルは振盪せず、激しく攪拌しないこと。

14.1.2 本剤は日局生理食塩液又は5%ブドウ糖注射液に希釈する。なお、1回240mg、360mg又は480mg投与時の総液量は体重30kg以上の患者には150mL以下、体重30kg未満の患者には100mL以下とする。

3mg/kg投与時は最終濃度が0.35mg/mL以上となるように希釈する。

14.1.3 添加後は静かに混和し、急激な振盪は避けること。

14.1.4 希釈後の液は速やかに使用すること。また、使用後も残液は、細菌汚染のおそれがあるので使用しないこと。

14.1.5 希釈後の最終濃度0.35mg/mL未満では、本剤の点滴溶液中の安定性が確認されていない。

14.1.6 他剤との混注はしないこと。

14.2 薬剤投与時の注意 本剤の投与にあたっては、インラインフィルター(0.2又は0.22μm)を使用すること。

15. その他の注意

15.1 臨床使用に基づく情報

15.1.1 国内外において本剤に対する抗体の産生が報告されている。

15.1.2 海外臨床試験において、本剤による治療後に同種造血幹細胞移植が実施された症例で、重篤な移植片対宿主病等の移植関連合併症が認められた。

15.2 非臨床試験に基づく情報 サルに本剤50mg/kgを週1回、4週間反復投与した結果、脈絡叢へのリンパ球及び形質細胞浸潤が認められたとの報告がある。

20. 取扱い上の注意 外箱開封後は遮光して保存すること。

21. 承認条件

〈悪性黒色腫、切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌、根治切除不能又は転移性の腎細胞癌、再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫、再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌、治癒切除不能な進行・再発の胃癌、切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫、がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する結腸・直腸癌、がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発の食道癌、食道癌における術後補助療法、原発不明癌〉

21.1 医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。

〈再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫〉

21.2 国内での治験症例が極めて限られていることから、製造販売後、一定数の症例に係るデータが集積されるまでの間は、全症例を対象に使用成績調査を実施することにより、本剤使用患者の背景情報を把握するとともに、本剤の安全性及び有効性に関するデータを早期に収集し、本剤の適正使用に必要な措置を講じること。

22. 包装

〈オブジーボ点滴静注20mg〉 2mL[1バイアル]

〈オブジーボ点滴静注100mg〉 10mL[1バイアル]

〈オブジーボ点滴静注120mg〉 12mL[1バイアル]

〈オブジーボ点滴静注240mg〉 24mL[1バイアル]

プロモーション提携

ブリストル・マイヤーズ スクワイブ株式会社

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-2-1

文献請求及び当社製品情報に関するお問い合わせ先 電話 0120-093-507

販売情報提供活動に関するお問い合わせ先 電話 0120-487-200

* 2022年10月改訂