



海外第Ⅲ相試験 (CA209067試験) (海外データ)

薬価基準収載

抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗ヒトPD-1モノクローナル抗体
オプジーザ®点滴静注
20mg, 100mg, 120mg, 240mg

ニボルマブ(遺伝子組換え)製剤
生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品^注
注)注意—医師等の処方箋により使用すること

OPDIVO®
(nivolumab)

薬価基準収載

抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗ヒトCTLA-4モノクローナル抗体
ヤーボイ®点滴静注液
20mg, 50mg

イピリムマブ(遺伝子組換え)製剤 YERVOY®
生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品^注
注)注意—医師等の処方箋により使用すること

1. 警告

- 1.1 本剤は、緊急時に十分対応できる医療施設において、がん化学療法に十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本剤の使用が適切と判断される症例についてのみ投与すること。また、治療開始に先立ち、患者又はその家族に有効性及び危険性を十分説明し、同意を得てから投与すること。
- 1.2 間質性肺疾患があらわれ、死亡に至った症例も報告されているので、初期症状(息切れ、呼吸困難、咳嗽、疲労等)の確認及び胸部X線検査の実施等、観察を十分に行うこと。また、異常が認められた場合には本剤の投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。
[8.2、9.1.2、11.1.1参照]

2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)
本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

1. 警告

- 1.1 本剤は、緊急時に十分対応できる医療施設において、がん化学療法に十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本剤の使用が適切と判断される症例についてのみ投与すること。また、治療開始に先立ち、患者又はその家族に有効性及び危険性を十分説明し、同意を得てから投与すること。
- 1.2 本剤投与により、重篤な下痢、大腸炎、消化管穿孔があらわれることがあり、本剤の投与終了から数カ月後に発現し、死亡に至った例も報告されている。投与中だけでなく、投与終了後も観察を十分に行い、異常が認められた場合には、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。
[8.2、11.1.1、11.1.2参照]

2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)
本剤の成分に対し重度の過敏症の既往歴のある患者

本試験におけるオプジー[®]ボの用法及び用量は、現在承認されている用法及び用量と異なります。

海外第Ⅲ相試験(CA209067試験) (海外データ)¹²⁻¹⁴⁾

目的 化学療法未治療の根治切除不能なⅢ期／Ⅳ期の悪性黒色腫を対象として、オプジー[®]ボ単剤投与及びオプジー[®]ボ+ヤーボイ併用投与のヤーボイ単剤投与に対する優越性を検証するとともに安全性も検討する。

試験デザイン 多施設共同二重盲検無作為化比較第Ⅲ相試験 [優越性試験]

対象 化学療法未治療の根治切除不能なⅢ期／Ⅳ期の悪性黒色腫患者 945例
(オプジー[®]ボ+ヤーボイ群:314例、オプジー[®]ボ群:316例、ヤーボイ群:315例)

投与方法 オプジー[®]ボ+ヤーボイ群:オプジー[®]ボ1mg/kg及びヤーボイ3mg/kgを1日1回、3週間間隔で4回点滴静注した後、オプジー[®]ボ3mg/kgを2週間間隔で点滴静注した。6週を1サイクルとした。
オプジー[®]ボ群:オプジー[®]ボ3mg/kgを1日1回、2週間間隔で点滴静注した。6週を1サイクルとした。
ヤーボイ群:ヤーボイ3mg/kgを1日1回、3週間間隔で4回点滴静注した。6週を1サイクルとした。

評価項目 主要評価項目:全生存期間(OS)、無増悪生存期間(PFS)

[オプジー[®]ボ+ヤーボイ群/オプジー[®]ボ群 vs. ヤーボイ群]

副次的評価項目:奏効率(ORR) [オプジー[®]ボ+ヤーボイ群/オプジー[®]ボ群 vs. ヤーボイ群]、

OS、PFS、ORR [オプジー[®]ボ+ヤーボイ群 vs. オプジー[®]ボ群]、

OSの予測バイオマーカーとしてのPD-L1の発現状況、健康関連QoL

探索的評価項目:奏効に至るまでの期間、奏効期間(DOR)、安全性及び忍容性、薬物動態、免疫原性、バイオマーカー(PD-L1等)の発現と有効性評価項目との関連性、自然発生性の遺伝子変異(BRAF遺伝子等)と有効性評価項目との関連性等

解析計画 主要評価項目:全生存期間(OS) [オプジー[®]ボ+ヤーボイ群/オプジー[®]ボ群 vs. ヤーボイ群]

有意水準0.04で優越性検定を行った。PD-L1発現状況、BRAF遺伝子変異、スクリーニング時のMステージを層別因子とした層別log-rank検定(両側)を用いて群間比較し、ハザード比とその両側98%信頼区間を、投与群を共変量として上記の因子を層別因子としたCox比例ハザードモデルを用いて算出した。Kaplan-Meier法を用いて中央値とその両側95%信頼区間を算出した。

無増悪生存期間(PFS) [オプジー[®]ボ+ヤーボイ群/オプジー[®]ボ群 vs. ヤーボイ群]

有意水準0.01で優越性検定を行った。OSと同様の検定法を用いて、群間比較、ハザード比とその両側99.5%信頼区間、中央値とその両側95%信頼区間の算出を行った。

副次的評価項目:奏効率(ORR)

PD-L1発現状況、BRAF遺伝子変異、スクリーニング時のMステージを層別因子とした両側Cochran-Mantel-Haenszel検定を用いて群間比較し、オッズ比とその両側99.5%信頼区間を算出した。Clopper-Pearson法を用いて、ORRとその両側95%信頼区間を投与群ごとに算出した。

OS及びPFS [オプジー[®]ボ+ヤーボイ群 vs. オプジー[®]ボ群] (記述的統計)

主要評価項目と同様の検定法を用いて、群間比較、ハザード比とその両側95%信頼区間、中央値とその両側95%信頼区間の算出を行った。

探索的評価項目:OS及びORRについて事前に規定した患者背景因子[BRAF遺伝子の変異状況、PD-L1発現状況(カットオフ値5%、1%)]別の解析を行った。

奏効期間(DOR)及び奏効に至るまでの期間について、Kaplan-Meier法を用いて要約統計量を投与群ごとに算出した。

サブグループ解析:ORRについて、事前に規定した患者背景因子(BRAF遺伝子の変異状況、PD-L1発現状況)別

サブグループ解析を行い、OS及びPFSでは事前に規定した患者背景因子(年齢、性別、人種、PD-L1発現状況、M分類、AJCC病期、BRAF遺伝子の変異状況、地域、LDH値、脳転移、喫煙歴)別サブグループ解析を行った。

12)小野薬品工業 / ブリストル・マイヤーズ スクイブ: 海外第Ⅲ相(CA209067)試験成績(社内資料) 承認時評価資料


13)Larkin J. et al.: N. Engl. J. Med., 373: 23, 2015.

[利益相反]本試験は、Bristol-Myers Squibbの支援をうけて実施された。

14)Wolchok J.D. et al.: N. Engl. J. Med., 377: 1345, 2017.

[利益相反]本試験は、Bristol-Myers Squibbの支援をうけて実施された。

投与方法¹²⁾



治験薬の投与は病勢進行又は許容できない毒性の発現まで継続した。

臨床的有用性及び忍容性があると実施医療機関の医師により判断された場合、初回PD (RECISTガイドライン1.1版) 後も治療継続可能とした。

4. 効能又は効果(一部抜粋) 悪性黒色腫

6. 用法及び用量(一部抜粋)

〈悪性黒色腫〉

通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。ただし、悪性黒色腫における術後補助療法の場合は、投与期間は12ヵ月間までとする。

根治切除不能な悪性黒色腫に対してイピリムマブ(遺伝子組換え)と併用する場合は、通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回80mgを3週間間隔で4回点滴静注する。その後、ニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。

7. 用法及び用量に連関する注意(一部抜粋)

〈効能共通〉

7.1 本剤は、30分以上かけて点滴静注すること。

〈悪性黒色腫〉

7.2 根治切除不能な悪性黒色腫に対して、イピリムマブ(遺伝子組換え)と併用する場合は、臨床試験に組み入れられた患者の前治療歴等について、「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、併用の必要性について慎重に判断すること。また、イピリムマブ(遺伝子組換え)の上乗せによる延命効果は、PD-L1を発現した腫瘍細胞が占める割合(PD-L1発現率)により異なる傾向が示唆されている。イピリムマブ(遺伝子組換え)との併用投与に際してPD-L1発現率の測定結果が得られ、PD-L1発現率が高いことが確認された患者においては、本剤単独投与の実施についても十分検討した上で、慎重に判断すること。[17.1.6参照]

患者背景¹²⁾

		オプジー+ヤーボイ群 (314例)	オプジー群 (316例)	ヤーボイ群 (315例)
年齢	中央値、歳	61	60	62
	範囲、歳	18~88	25~90	18~89
	<65歳、例数	185(58.9%)	198(62.7%)	182(57.8%)
	≥65歳、例数	129(41.1%)	118(37.3%)	133(42.2%)
性別、例数	男性	206(65.6%)	202(63.9%)	202(64.1%)
	女性	108(34.4%)	114(36.1%)	113(35.9%)
人種、例数	白人	310(98.7%)	308(97.5%)	303(96.2%)
	黒人/アフリカ系米国人	0	0	0
	アジア人	2(0.6%)	2(0.6%)	6(1.9%)
	アメリカ/アラスカ先住民	0	1(0.3%)	0
	ハワイ先住民/太平洋諸島民	0	1(0.3%)	0
	その他	2(0.6%)	4(1.3%)	5(1.6%)
	報告なし	0	0	1(0.3%)
PD-L1発現、例数	あり	144(45.9%)	143(45.3%)	144(45.7%)
	なし/評価不能	170(54.1%)	173(54.7%)	171(54.3%)
M分類、例数	M1c	185(58.9%)	185(58.5%)	189(60.0%)
	M0/M1a/M1b	129(41.1%)	131(41.5%)	126(40.0%)
AJCC病期、例数	Ⅲ期	17(5.4%)	25(7.9%)	22(7.0%)
	Ⅳ期	297(94.6%)	291(92.1%)	293(93.0%)
BRAF遺伝子変異	あり	102(32.5%)	98(31.0%)	100(31.7%)
	なし	212(67.5%)	218(69.0%)	215(68.3%)
地域	米国	64(20.4%)	68(21.5%)	75(23.8%)
	欧州	177(56.4%)	170(53.8%)	170(54.0%)
	オーストラリア	40(12.7%)	38(12.0%)	37(11.7%)
	その他	33(10.5%)	40(12.7%)	33(10.5%)
LDH値、例数	≤正常上限	199(63.4%)	196(62.0%)	194(61.6%)
	>正常上限	114(36.3%)	112(35.4%)	115(36.5%)
	≤正常上限の2倍	276(87.9%)	271(85.8%)	279(88.6%)
	>正常上限の2倍	37(11.8%)	37(11.7%)	30(9.5%)
	不明	1(0.3%)	8(2.5%)	6(1.9%)
脳転移、例数	あり	11(3.5%)	8(2.5%)	15(4.8%)
	なし	303(96.5%)	308(97.5%)	300(95.2%)
喫煙歴、例数	あり	138(43.9%)	133(42.1%)	139(44.1%)
	なし	161(51.3%)	170(53.8%)	167(53.0%)
	不明	15(4.8%)	13(4.1%)	9(2.9%)


有効性¹²⁾

●全生存期間(OS) [主要評価項目] [オプジー+ヤーボイ群/オプジー+ボ群 vs. ヤーボイ群]

全生存期間(OS)について、オプジー+ヤーボイ群及びオプジー+ボ群のヤーボイ群に対する優越性が検証されました($p<0.0001$:有意水準0.04^{*1})。すべての被験者が28ヵ月の観察期間を完了した時点における、オプジー+ヤーボイ群及びオプジー+ボ群のヤーボイ群に対するハザード比は、それぞれ0.55(98%信頼区間[0.42, 0.72]^{*2})、0.63(98%信頼区間[0.48, 0.81]^{*2})でした。



OSのKaplan-Meier曲線(無作為化全症例)



*1:PD-L1発現状況、BRAF遺伝子変異、スクリーニング時のMステージを層別因子としたlog-rank検定

*2:投与群を共変量とし、PD-L1発現状況、BRAF遺伝子変異、スクリーニング時のMステージを層別因子としたCox比例ハザードモデル

*3:Kaplan-Meier法

●全生存期間(OS) [副次的評価項目] [オプジー+ヤーボイ群 vs. オプジー+ボ群]

全生存期間(OS)について、すべての被験者が28ヵ月の観察を完了した時点における、オプジー+ボ群に対するオプジー+ヤーボイ群のハザード比は0.88(95%信頼区間[0.69, 1.12]^{*1})でした(記述的統計)。

*1:Cox比例ハザードモデル

4. 効能又は効果(一部抜粋) 悪性黒色腫

6. 用法及び用量(一部抜粋)

〈悪性黒色腫〉

通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。ただし、悪性黒色腫における術後補助療法の場合は、投与期間は12ヵ月間までとする。

根治切除不能な悪性黒色腫に対してイピリムマブ(遺伝子組換え)と併用する場合は、通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回80mgを3週間間隔で4回点滴静注する。その後、ニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。

7. 用法及び用量に関連する注意(一部抜粋)

〈効能共通〉

7.1 本剤は、30分以上かけて点滴静注すること。


〈悪性黒色腫〉

7.2 根治切除不能な悪性黒色腫に対して、イピリムマブ(遺伝子組換え)と併用する場合は、臨床試験に組み入れられた患者の前治療歴等について、「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、併用の必要性について慎重に判断すること。また、イピリムマブ(遺伝子組換え)の上乗せによる延命効果は、PD-L1を発現した腫瘍細胞が占める割合(PD-L1発現率)により異なる傾向が示唆されている。イピリムマブ(遺伝子組換え)との併用投与に際してPD-L1発現率の測定結果が得られ、PD-L1発現率が高いことが確認された患者においては、本剤単独投与の実施についても十分検討した上で、慎重に判断すること。[17.1.6参照]

●無増悪生存期間(PFS) [主要評価項目] [オプジー+ヤーボイ群/オプジー群 vs. ヤーボイ群]

無増悪生存期間(PFS)について、オプジー+ヤーボイ群及びオプジー群のヤーボイ群に対する優越性が検証されました($p<0.0001$:有意水準0.01^{※1})。すべての被験者が9ヵ月の観察期間を完了した時点における、オプジー+ヤーボイ群及びオプジー群のヤーボイ群に対するハザード比は、それぞれ0.42(99.5%信頼区間[0.31, 0.57]^{※2})、0.57(99.5%信頼区間[0.43, 0.76]^{※2})でした。なお、抗腫瘍効果は実施医療機関の医師がRECISTガイドライン1.1版に従い判定しました。

 PFSのKaplan-Meier曲線(無作為化全症例)



※1:PD-L1発現状況、BRAF遺伝子変異、スクリーニング時のMステージを層別因子としたlog-rank検定

※2:投与群を共変量とし、PD-L1発現状況、BRAF遺伝子変異、スクリーニング時のMステージを層別因子としたCox比例ハザードモデル

※3:Kaplan-Meier法

●無増悪生存期間(PFS) [副次的評価項目] [オプジー+ヤーボイ群 vs. オプジー群]

無増悪生存期間(PFS)について、すべての被験者が9ヵ月の観察を完了した時点における、オプジー群に対するオプジー+ヤーボイ群のハザード比は0.74(95%信頼区間[0.60, 0.92]^{※1})でした(記述的統計)。

※1:Cox比例ハザードモデル

●奏効率(ORR)^{*1} [副次的評価項目]

奏効率(ORR)は、オプジー+ヤーボイ群で57.6%(181/314例、95%信頼区間[52.0, 63.2]^{*2})、オプジー群で43.7%(138/316例、95%信頼区間[38.1, 49.3]^{*2})、ヤーボイ群で19.0%(60/315例、95%信頼区間[14.9, 23.8]^{*2})でした。ヤーボイ群に対するオプジー+ヤーボイ群及びオプジー群のオッズ比は、それぞれ6.11(99.5%信頼区間[3.59, 10.38]^{*3})、3.40(99.5%信頼区間[2.02, 5.72]^{*3})であり、オプジー+ヤーボイ群及びオプジー群で有意に高い奏効率でした($p<0.0001^{*3}$)。なお、抗腫瘍効果は実施医療機関の医師がRECISTガイドライン1.1版に従い判定しました。

※1:すべての被験者が9ヶ月の観察期間を完了した時点のデータ

※2:Clopper-Pearson法

※3:PD-L1発現状況、BRAF遺伝子変異、スクリーニング時のMステージを層別因子とした両側Cochran-Mantel-Haenszel検定

●奏効期間(DOR)^{*1} [探索的評価項目]

奏効が認められたオプジー+ヤーボイ群の181/314例、オプジー群の138/316例、ヤーボイ群の60/315例において、奏効期間(DOR)の中央値は、いずれの群も未達でした。なお、抗腫瘍効果は実施医療機関の医師がRECISTガイドライン1.1版に従い判定しました。

※1:すべての被験者が9ヶ月の観察期間を完了した時点のデータ

●奏効に至るまでの期間^{*1} [探索的評価項目]

奏効が認められたオプジー+ヤーボイ群の181/314例、オプジー群の138/316例、ヤーボイ群の60/315例において、奏効に至るまでの期間の中央値(最小値～最大値)は、それぞれ2.76ヶ月(1.1～11.6)、2.78ヶ月(2.3～12.5)、2.79ヶ月(2.5～12.4)でした。なお、抗腫瘍効果は実施医療機関の医師がRECISTガイドライン1.1版に従い判定しました。

※1:すべての被験者が9ヶ月の観察期間を完了した時点のデータ

4. 効能又は効果(一部抜粋) 悪性黒色腫

6. 用法及び用量(一部抜粋)

〈悪性黒色腫〉

通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。ただし、悪性黒色腫における術後補助療法の場合は、投与期間は12ヶ月間までとする。

根治切除不能な悪性黒色腫に対してイピリムマブ(遺伝子組換え)と併用する場合は、通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回80mgを3週間間隔で4回点滴静注する。その後、ニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。

7. 用法及び用量に関する注意(一部抜粋)

〈効能共通〉

7.1 本剤は、30分以上かけて点滴静注すること。

〈悪性黒色腫〉

7.2 根治切除不能な悪性黒色腫に対して、イピリムマブ(遺伝子組換え)と併用する場合は、臨床試験に組み入れられた患者の前治療歴等について、「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、併用の必要性について慎重に判断すること。また、イピリムマブ(遺伝子組換え)の上乗せによる延命効果は、PD-L1を発現した腫瘍細胞が占める割合(PD-L1発現率)により異なる傾向が示唆されている。イピリムマブ(遺伝子組換え)との併用投与に際してPD-L1発現率の測定結果が得られ、PD-L1発現率が高いことが確認された患者においては、本剤単独投与の実施についても十分検討した上で、慎重に判断すること。[17.1.6参照]

●奏効率(ORR:BRAF遺伝子の変異状況別) [探索的評価項目]・[サブグループ解析]

すべての被験者が9ヶ月の観察期間を完了した時点における、BRAF遺伝子の変異状況別の奏効率(ORR)は下表の通りでした。なお、抗腫瘍効果は実施医療機関の医師がRECISTガイドライン1.1版に従い判定しました。

	BRAF遺伝子変異型		BRAF遺伝子野生型	
	奏効例数/症例数	奏効率 [95%信頼区間]*	奏効例数/症例数	奏効率 [95%信頼区間]*
オプジーボ+ヤーボイ群	68/102例	66.7% [56.6, 75.7]	113/212例	53.3% [46.3, 60.2]
オプジーボ群	36/98例	36.7% [27.2, 47.1]	102/218例	46.8% [40.0, 53.6]
ヤーボイ群	22/100例	22.0% [14.3, 31.4]	38/215例	17.7% [12.8, 23.4]

*:Clopper-Pearson法

4. 効能又は効果(一部抜粋)
悪性黒色腫

6. 用法及び用量(一部抜粋)

〈悪性黒色腫〉

通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。ただし、悪性黒色腫における術後補助療法の場合は、投与期間は12ヶ月間までとする。

根治切除不能な悪性黒色腫に対してイピリムマブ(遺伝子組換え)と併用する場合は、通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回80mgを3週間間隔で4回点滴静注する。その後、ニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。

7. 用法及び用量に関する注意(一部抜粋)

〈効能共通〉

7.1 本剤は、30分以上かけて点滴静注すること。

〈悪性黒色腫〉


7.2 根治切除不能な悪性黒色腫に対して、イピリムマブ(遺伝子組換え)と併用する場合は、臨床試験に組み入れられた患者の前治療歴等について、「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、併用の必要性について慎重に判断すること。また、イピリムマブ(遺伝子組換え)の上乗せによる延命効果は、PD-L1を発現した腫瘍細胞が占める割合(PD-L1発現率)により異なる傾向が示唆されている。イピリムマブ(遺伝子組換え)との併用投与に際してPD-L1発現率の測定結果が得られ、PD-L1発現率が高いことが確認された患者においては、本剤単独投与の実施についても十分検討した上で、慎重に判断すること。[17.1.6参照]

●全生存期間(OS:PD-L1発現状況別、カットオフ値5%) [探索的評価項目]・[サブグループ解析]


PD-L1発現 $\geq 5\%$ の全生存期間(OS)中央値は、オプジー+ヤーボイ群及びオプジーボ群で未達、ヤーボイ群で28.88ヶ月(95%信頼区間[18.10, -])でした。一方、PD-L1発現<5%のOS中央値は、オプジー+ヤーボイ群及びオプジーボ群で未達、ヤーボイ群で18.50ヶ月(95%信頼区間[13.70, 22.51])でした。



OSのKaplan-Meier曲線(PD-L1発現 $\geq 5\%$)



OSのKaplan-Meier曲線(PD-L1発現<5%)




*:Kaplan-Meier法

●全生存期間(OS:PD-L1発現状況別、カットオフ値1%) [探索的評価項目]・[サブグループ解析]


PD-L1発現 $\geq 1\%$ の全生存期間(OS)中央値は、オプジー+ボヤーボイ群及びオプジーボ群で未達、ヤーボイ群で22.11ヶ月(95%信頼区間[17.08, 29.67]^{**})でした。一方、PD-L1発現<1%のOS中央値は、オプジー+ボヤーボイ群で23.46ヶ月(95%信頼区間[13.01, -]^{**})、ヤーボイ群で18.56ヶ月(95%信頼区間[13.67, 23.20]^{**})でした。

● OSのKaplan-Meier曲線(PD-L1発現 $\geq 1\%$)



	At risk数													
オプジー+ボヤーボイ群	155	144	132	127	116	112	105	102	101	99	85	27	3	0
オプジー群	171	165	158	148	139	131	122	117	112	109	98	36	1	0
ヤーボイ群	164	155	138	126	115	102	89	83	77	74	64	21	2	0

● OSのKaplan-Meier曲線(PD-L1発現<1%)



	At risk数													
オプジー+ボヤーボイ群	123	113	102	91	82	82	79	74	74	72	66	18	4	0
オプジー群	117	103	86	76	73	65	62	59	57	55	50	16	2	0
ヤーボイ群	113	96	87	79	71	61	57	50	44	43	32	10	1	0

※:Kaplan-Meier法

●奏効率(ORR:PD-L1発現状況別) [探索的評価項目]・[サブグループ解析]

すべての被験者が9ヶ月の観察期間を完了した時点における、PD-L1発現状況別の奏効率(ORR)は下表の通りでした。なお、抗腫瘍効果は実施医療機関の医師がRECISTガイドライン1.1版に従い判定しました。

・カットオフ値5%

	PD-L1発現≥5%		PD-L1発現<5%	
	奏効例数/症例数	奏効率 [95%信頼区間]*	奏効例数/症例数	奏効率 [95%信頼区間]*
オプジー+ヤーボイ群	49/68例	72.1% [59.9, 82.3]	115/210例	54.8% [47.8, 61.6]
オプジー群	46/80例	57.5% [45.9, 68.5]	86/208例	41.3% [34.6, 48.4]
ヤーボイ群	16/75例	21.3% [12.7, 32.3]	36/202例	17.8% [12.8, 23.8]

*:Clopper-Pearson法

・カットオフ値1%

	PD-L1発現≥1%		PD-L1発現<1%	
	奏効例数/症例数	奏効率 [95%信頼区間]*	奏効例数/症例数	奏効率 [95%信頼区間]*
オプジー+ヤーボイ群	100/155例	64.5% [56.4, 72.0]	64/123例	52.0% [42.8, 61.1]
オプジー群	93/171例	54.4% [46.6, 62.0]	39/117例	33.3% [24.9, 42.6]
ヤーボイ群	31/164例	18.9% [13.2, 25.7]	21/113例	18.6% [11.9, 27.0]

*:Clopper-Pearson法

4. 効能又は効果(一部抜粋) 悪性黒色腫

6. 用法及び用量(一部抜粋)

〈悪性黒色腫〉

通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。ただし、悪性黒色腫における術後補助療法の場合は、投与期間は12ヶ月間までとする。

根治切除不能な悪性黒色腫に対してイピリムマブ(遺伝子組換え)と併用する場合は、通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回80mgを3週間間隔で4回点滴静注する。その後、ニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。

7. 用法及び用量に関する注意(一部抜粋)

〈効能共通〉

7.1 本剤は、30分以上かけて点滴静注すること。


〈悪性黒色腫〉

7.2 根治切除不能な悪性黒色腫に対して、イピリムマブ(遺伝子組換え)と併用する場合は、臨床試験に組み入れられた患者の前治療歴等について、「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、併用の必要性について慎重に判断すること。また、イピリムマブ(遺伝子組換え)の上乗せによる延命効果は、PD-L1を発現した腫瘍細胞が占める割合(PD-L1発現率)により異なる傾向が示唆されている。イピリムマブ(遺伝子組換え)との併用投与に際してPD-L1発現率の測定結果が得られ、PD-L1発現率が高いことが確認された患者においては、本剤単独投与の実施についても十分検討した上で、慎重に判断すること。[17.1.6参照]

●全生存期間(OS)の層別解析 [副次的評価項目・サブグループ解析]

全生存期間(OS)のサブグループ解析(オプジーボ+ヤーボイ群 vs. オプジーボ群)は以下の通りでした。

●全生存期間(OS)の層別解析(オプジーボ+ヤーボイ群 vs. オプジーボ群、記述的統計)



※:非層別Cox比例ハザードモデル

ハザード比及びその95%信頼区間は、各治療群の症例数が10例未満のサブセットについては算出しない

安全性¹²⁾

臨床検査値異常変動を含む副作用はオプジー+ヤーボイ群で95.8%(300/313例)、オプジー群で86.3%(270/313例)、ヤーボイ群で86.2%(268/311例)に認められました。

主な副作用(20%以上)は、オプジー+ヤーボイ群では、下痢45.4%(142例)、疲労37.7%(118例)、そう痒症35.8%(112例)、発疹29.1%(91例)及び恶心28.1%(88例)であり、オプジー群では、疲労35.5%(111例)、発疹23.0%(72例)、下痢及びそう痒症が各21.4%(67例)、ヤーボイ群では、そう痒症36.3%(113例)、下痢33.8%(105例)、疲労28.6%(89例)及び発疹21.9%(68例)でした。

重篤な副作用は、オプジー+ヤーボイ群48.6%(152例)、オプジー群9.9%(31例)、ヤーボイ群22.5%(70例)に認められ、5%以上に認められた重篤な副作用はオプジー+ヤーボイ群では大腸炎9.6%(30例)及び下痢8.9%(28例)、ヤーボイ群では大腸炎8.4%(26例)及び下痢7.4%(23例)でした。1%以上に認められた重篤な副作用は、オプジー+ヤーボイ群では大腸炎9.6%(30例)、下痢8.9%(28例)、発熱4.2%(13例)、トランスマニナーゼ上昇2.6%(8例)、恶心、副腎機能不全及び下垂体炎各2.2%(7例)、甲状腺機能亢進症、自己免疫性肝炎及び肺臓炎各1.9%(6例)、嘔吐及び肝毒性各1.6%(5例)、疲労、肝炎及び脱水各1.3%(4例)、全身健康状態低下、高血糖、急性腎障害、アラニンアミノトランスマニナーゼ増加及び肝酵素上昇各1.0%(3例)、オプジー群では大腸炎1.0%(3例)、ヤーボイ群では大腸炎8.4%(26例)、下痢7.4%(23例)、下垂体炎2.6%(8例)、発熱1.9%(6例)でした。投与中止に至った副作用は、オプジー+ヤーボイ群39.6%(124例)、オプジー群11.5%(36例)、ヤーボイ群16.1%(50例)に認められ、5%以上に認められた投与中止に至った副作用はオプジー+ヤーボイ群では大腸炎9.6%(30例)及び下痢8.0%(25例)、ヤーボイ群では大腸炎7.1%(22例)でした。1%以上に認められた投与中止に至った副作用は、オプジー+ヤーボイ群では大腸炎9.6%(30例)、下痢8.0%(25例)、アラニンアミノトランスマニナーゼ増加4.8%(15例)、アスパラギン酸アミノトランスマニナーゼ増加4.5%(14例)、トランスマニナーゼ上昇2.2%(7例)、肺臓炎及び肝毒性各1.9%(6例)、リパーゼ増加1.3%(4例)、呼吸困難、肝炎及び発疹各1.0%(3例)、オプジー群では下痢2.2%(7例)、疲労及びアラニンアミノトランスマニナーゼ増加各1.0%(3例)、ヤーボイ群では大腸炎7.1%(22例)、下痢4.8%(15例)、アラニンアミノトランスマニナーゼ増加1.0%(3例)でした。最終投与後100日以内に死亡に至った副作用は、オプジー群0.3%(1例:好中球減少症)、ヤーボイ群0.3%[1例:大腸炎(結腸穿孔)]であり、オプジー+ヤーボイ群では認められませんでした。なお、最終投与後100日以降に死亡に至った副作用がオプジー+ヤーボイ群で0.6%(2例)に認められました(自己免疫性心筋炎による心不全、肝毒性及び肝壞死)。

4. 効能又は効果(一部抜粋) 悪性黒色腫

6. 用法及び用量(一部抜粋)

〈悪性黒色腫〉

通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。ただし、悪性黒色腫における術後補助療法の場合は、投与期間は12カ月間までとする。

根治切除不能な悪性黒色腫に対してイピリムマブ(遺伝子組換え)と併用する場合は、通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回80mgを3週間間隔で4回点滴静注する。その後、ニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。

7. 用法及び用量に関する注意(一部抜粋)

〈効能共通〉

7.1 本剤は、30分以上かけて点滴静注すること。

〈悪性黒色腫〉

7.2 根治切除不能な悪性黒色腫に対して、イピリムマブ(遺伝子組換え)と併用する場合は、臨床試験に組み入れられた患者の前治療歴等について、「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、併用の必要性について慎重に判断すること。また、イピリムマブ(遺伝子組換え)の上乗せによる延命効果は、PD-L1を発現した腫瘍細胞が占める割合(PD-L1発現率)により異なる傾向が示唆されている。イピリムマブ(遺伝子組換え)との併用投与に際してPD-L1発現率の測定結果が得られ、PD-L1発現率が高いことが確認された患者においては、本剤単独投与の実施についても十分検討した上で、慎重に判断すること。[17.1.6 参照]

いずれかの群で5%以上に発現した副作用一覧

副作用項目	オプジー+ヤーボイ群 313例			オプジーボ群 313例			ヤーボイ群 311例		
	全Grade n(%)	Grade 3-4 n(%)	Grade 5 n(%)	全Grade n(%)	Grade 3-4 n(%)	Grade 5 n(%)	全Grade n(%)	Grade 3-4 n(%)	Grade 5 n(%)
皮膚および皮下組織障害	207(66.1)	21(6.7)		158(50.5)	8(2.6)		177(56.9)	9(2.9)	
発疹	91(29.1)	10(3.2)		72(23.0)	1(0.3)		68(21.9)	5(1.6)	
そう痒症	112(35.8)	6(1.9)		67(21.4)	1(0.3)		113(36.3)	1(0.3)	
尋常性白斑	27(8.6)			28(8.9)	1(0.3)		16(5.1)		
皮膚乾燥	15(4.8)			17(5.4)			11(3.5)		
斑状丘疹状皮疹	38(12.1)	6(1.9)		14(4.5)	2(0.6)		38(12.2)	1(0.3)	
一般・全身障害および投与部位の状態	181(57.8)	15(4.8)		145(46.3)	5(1.6)		127(40.8)	8(2.6)	
疲労	118(37.7)	13(4.2)		111(35.5)	3(1.0)		89(28.6)	3(1.0)	
無力症	31(9.9)	1(0.3)		25(8.0)	1(0.3)		17(5.5)	2(0.6)	
発熱	60(19.2)	2(0.6)		21(6.7)			21(6.8)	1(0.3)	
悪寒	22(7.0)			12(3.8)			10(3.2)		
胃腸障害	198(63.3)	57(18.2)		123(39.3)	14(4.5)		170(54.7)	39(12.5)	
下痢	142(45.4)	30(9.6)		67(21.4)	9(2.9)		105(33.8)	18(5.8)	
恶心	88(28.1)	7(2.2)		41(13.1)			51(16.4)	2(0.6)	
嘔吐	50(16.0)	8(2.6)		22(7.0)	1(0.3)		24(7.7)	1(0.3)	
便秘	12(3.8)			19(6.1)			17(5.5)		
腹痛	28(8.9)	1(0.3)		18(5.8)			28(9.0)	2(0.6)	
口内乾燥	19(6.1)			13(4.2)			7(2.3)		
大腸炎	40(12.8)	26(8.3)		7(2.2)	3(1.0)		35(11.3)	24(7.7)	
神経系障害	86(27.5)	12(3.8)		66(21.1)	3(1.0)		57(18.3)	1(0.3)	
頭痛	34(10.9)	2(0.6)		24(7.7)			25(8.0)	1(0.3)	
味覚異常	14(4.5)			18(5.8)			9(2.9)		
浮動性めまい	17(5.4)			15(4.8)			11(3.5)		
筋骨格系および結合組織障害	71(22.7)	7(2.2)		64(20.4)	5(1.6)		47(15.1)	1(0.3)	
関節痛	42(13.4)	1(0.3)		29(9.3)	1(0.3)		21(6.8)		
筋肉痛	17(5.4)	1(0.3)		15(4.8)	1(0.3)		9(2.9)		
臨床検査	141(45.0)	82(26.2)		58(18.5)	17(5.4)		55(17.7)	22(7.1)	
リパーゼ増加	43(13.7)	34(10.9)		24(7.7)	12(3.8)		18(5.8)	12(3.9)	
アミラーゼ増加	23(7.3)	9(2.9)		17(5.4)	5(1.6)		15(4.8)	4(1.3)	
アスパラギン酸アミトランスクエラーゼ増加	51(16.3)	19(6.1)		13(4.2)	3(1.0)		12(3.9)	2(0.6)	
アラニンアミトランスクエラーゼ増加	59(18.8)	27(8.6)		12(3.8)	3(1.0)		12(3.9)	5(1.6)	
体重減少	19(6.1)			10(3.2)			4(1.3)	1(0.3)	
内分泌障害	96(30.7)	18(5.8)		53(16.9)	4(1.3)		33(10.6)	8(2.6)	
甲状腺機能低下症	51(16.3)	1(0.3)		32(10.2)			14(4.5)		
甲状腺機能亢進症	34(10.9)	3(1.0)		15(4.8)			3(1.0)		
下垂体炎	23(7.3)	5(1.6)		2(0.6)	2(0.6)		12(3.9)	5(1.6)	
代謝および栄養障害	87(27.8)	17(5.4)		47(15.0)	5(1.6)		52(16.7)	5(1.6)	
食欲減退	60(19.2)	4(1.3)		36(11.5)			41(13.2)	1(0.3)	
呼吸器、胸郭および縦隔障害	69(22.0)	8(2.6)		44(14.1)	4(1.3)		39(12.5)	2(0.6)	
咳嗽	24(7.7)			20(6.4)	2(0.6)		15(4.8)		
呼吸困難	36(11.5)	3(1.0)		20(6.4)	1(0.3)		12(3.9)		
肺臓炎	21(6.7)	3(1.0)		4(1.3)	1(0.3)		5(1.6)	1(0.3)	

医師から報告された有害事象名は、MedDRA ver19.0を用いて読み替え、GradeはCTCAE v4.0を用いて評価しました。因果関係は、「関連あり」、「関連なし」の2段階で評価され、「関連あり」と判定された場合に、副作用として集計しました。なお、「不明」とされた場合も副作用として集計しました。また、発現頻度は、最終投与後30日までに発現・増悪した副作用を対象として集計しました。

**4. 効能又は効果(一部抜粋)
悪性黒色腫****6. 用法及び用量(一部抜粋)****〈悪性黒色腫〉**

通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。ただし、悪性黒色腫における術後補助療法の場合は、投与期間は12ヵ月間までとする。

根治切除不能な悪性黒色腫に対してイピリムマブ(遺伝子組換え)と併用する場合は、通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回80mgを3週間間隔で4回点滴静注する。その後、ニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。

7. 用法及び用量に関する注意(一部抜粋)**〈効能共通〉**

7.1 本剤は、30分以上かけて点滴静注すること。

〈悪性黒色腫〉

7.2 根治切除不能な悪性黒色腫に対して、イピリムマブ(遺伝子組換え)と併用する場合は、臨床試験に組み入れられた患者の前治療歴等について、「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、併用の必要性について慎重に判断すること。また、イピリムマブ(遺伝子組換え)の上乗せによる延命効果は、PD-L1を発現した腫瘍細胞が占める割合(PD-L1発現率)により異なる傾向が示唆されている。イピリムマブ(遺伝子組換え)との併用投与に際してPD-L1発現率の測定結果が得られ、PD-L1発現率が高いことが確認された患者においては、本剤単独投与の実施についても十分検討した上で、慎重に判断すること。[17.1.6参照]

—抗悪性腫瘍剤— ヒト型抗ヒトPD-1モノクローナル抗体 ニボルマブ(遺伝子組換え)製剤

生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品^{注1)}

オプジー[®]ボ点滴静注 20mg・100mg・120mg・240mg

OPDIVO[®] I.V. Infusion

貯 法：2~8℃で保存
有効期間：36箇月

注) 注意－医師等の処方箋により使用すること

日本標準商品分類番号 874291

薬価基準収載

	承認番号	販売開始	薬価収載
20mg	22600AMX00768000	2014年9月	2014年9月
100mg	22600AMX00769000		
120mg	30200AMX00925000	2020年11月	2020年11月
240mg	23000AMX00812000	2018年11月	2018年11月

最適使用推進ガイドライン対象品目

和物による治療歴のない患者における本剤の有効性及び安全性は確立していない。

5.14 十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、MSI-Highが確認された患者に投与すること。検査にあたっては、承認された体外診断用医薬品又は医療機器を用いること。なお、承認された体外診断用医薬品又は医療機器に関する情報については、以下のウェブサイトから入手可能である：
<https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/review-information/cd/001.html>

5.15 「17臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、本剤以外の治療の実施についても慎重に検討し、適応患者の選択を行うこと。[17.1.24参照]

5.16 本剤の術後補助療法における有効性及び安全性は確立していない。
(根治切除不能な進行・再発の食道癌)

5.17 「17臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。[17.1.25、17.1.26参照]
(食道癌における術後補助療法)

5.18 術前補助療法により病理学的完全奏効(pCR)が認められなかった患者に投与すること。

5.19 本剤の術前補助療法における有効性及び安全性は確立していない。

5.20 臨床試験に組み入れられた患者の前治療歴、pCRの定義等について、「17臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。[17.1.27参照]
(原発不明癌)

5.21 「原発不明がん診療ガイドライン」(日本臨床腫瘍学会)等の最新の情報を参考に、適切な全身検索及び病理学的検査を実施した上で、原発臓器が不明な上皮性悪性腫瘍と診断され、かつ、腫瘍の局在・組織型等に基づいて推奨される治療法のない患者であることを確認すること。

5.22 「17臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。[17.1.28参照]
(尿路上皮癌における術後補助療法)

5.23 シスプラチニ等のプラチナ製剤による治療が可能な場合にはこれらの治療を優先すること。

5.24 本剤の有効性は、原発部位により異なる傾向が示唆されている。原発部位ごとの結果について、「17臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、腎孟・尿管癌においては、術前補助療法歴も踏まえ、本剤以外の治療の実施についても慎重に検討し、適応患者の選択を行うこと。[17.1.29参照]

5.25 臨床試験に組み入れられた患者の病期等について、「17臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。[17.1.29参照]

5.26 本剤の術前補助療法における有効性及び安全性は確立していない。

注) International Metastatic RCC Database Consortium

1. 警告

- 1 本剤は、緊急時に十分対応できる医療施設において、がん化学療法に十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本剤の使用が適切と判断される症例についてのみ投与すること。また、治療開始に先立ち、患者又はその家族に有効性及び危険性を十分説明し、同意を得てから投与すること。
- 2 間質性肺疾患があらわれ、死亡に至った症例も報告されているので、初期症状（息切れ、呼吸困難、咳嗽、疲労等）の確認及び胸部X線検査の実施等、観察を十分に行うこと。また、異常が認められた場合には本剤の投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。[8.2、9.1.2、11.1.1参照]

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	オプジー [®] ボ 点滴静注 20mg	オプジー [®] ボ 点滴静注 100mg	オプジー [®] ボ 点滴静注 120mg	オプジー [®] ボ 点滴静注 240mg
有効成分				
含量 / 容量 ^{注2)} (1バイアル中)	20mg/2mL	100mg/10mL	120mg/12mL	240mg/24mL
D-マンニトール	60mg	300mg	360mg	720mg
クエン酸ナトリウム水和物	11.76mg	58.8mg	70.6mg	141mg
塩化ナトリウム	5.84mg	29.2mg	35.0mg	70.1mg
ジエチレントリアミン五酢酸	0.01576mg	0.0788mg	0.0946mg	0.189mg
ボリソルベート80	0.4mg	2mg	2.4mg	4.8mg
pH 調節剤 2成分	適量	適量	適量	適量

注1) 本剤は遺伝子組換え技術により、チャイニーズハムスター卵巣細胞を用いて製造される。

注2) 本品は注射液吸引時の損失を考慮して、過量充填されているので、実充填量は各々 22mg/22mL、105mg/10.5mL、126mg/12.6mL、246mg/24.6mLである。

3.2 製剤の性状

販売名	オプジー [®] ボ 点滴静注20mg	オプジー [®] ボ 点滴静注100mg	オプジー [®] ボ 点滴静注120mg	オプジー [®] ボ 点滴静注240mg
注射剤(バイアル)				
pH	5.5~6.5			
浸透圧比	約1.2 (生理食塩液対比)			
性状	無色～微黄色の澄明又は乳白光を呈する液。微粒子をわずかに認めることがある。			

4. 効能又は効果

- 悪性黒色腫
- 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌
- 根治切除不能又は転移性の腎細胞癌
- 再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫
- 再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌
- 治癒切除不能な進行・再発の胃癌
- 切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫
- がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する結腸・直腸癌
- 根治切除不能な進行・再発の食道癌
- 食道癌における術後補助療法
- 原発不明癌
- 尿路上皮癌における術後補助療法

5. 効能又は効果に関連する注意

〈悪性黒色腫〉

5.1 「17臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。[17.1.1-17.1.7参照]
(切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌)

5.2 臨床試験に組み入れられた患者のEGFR遺伝子変異又はALK融合遺伝子の有無等について、「17臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。[17.1.9-17.1.11参照]

5.3 本剤の術後補助療法における有効性及び安全性は確立していない。

(根治切除不能又は転移性の腎細胞癌)

5.4 化学療法未治療患者に対してイピリムマブ(遺伝子組換え)と併用する場合、IMDC^{注3)}リスク分類がintermediate又はpoorリスクの患者を対象とすること。

5.5 本剤の術後補助療法における有効性及び安全性は確立していない。

5.6 「17臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。[17.1.12-17.1.14参照]
(再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫)

5.7 「17臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。[17.1.15-17.1.17参照]
(再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌)

5.8 プラチナ製剤を含む化学療法による治療歴のない患者に対する本剤の有効性及び安全性は確立していない。

5.9 本剤の術後補助療法における有効性及び安全性は確立していない。

5.10 「17臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。[17.1.18参照]
(治癒切除不能な進行・再発の胃癌)

5.11 本剤の術後補助療法における有効性及び安全性は確立していない。

(切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫)

5.12 本剤の手術の補助療法における有効性及び安全性は確立していない。

(がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する結腸・直腸癌)

5.13 フッ化ピリミジン系抗悪性腫瘍剤、オキサリプラチン及びイリノテカイン塩酸塩水

6. 用法及び用量

〈悪性黒色腫〉 通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。ただし、悪性黒色腫における術後補助療法の場合は、投与期間は12ヶ月間までとする。

根治切除不能な悪性黒色腫に対してイピリムマブ(遺伝子組換え)と併用する場合は、通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回80mgを3週間間隔で4回点滴静注する。その後、ニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔で点滴静注する。

〈切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌、治癒切除不能な進行・再発の胃癌〉 通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。

他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合は、通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回360mgを3週間間隔で点滴静注する。

〈根治切除不能又は転移性の腎細胞癌〉 通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。

カボザンチニブと併用する場合は、通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。

化学療法未治療の根治切除不能又は転移性の腎細胞癌に対してイピリムマブ(遺伝子組換え)と併用する場合は、通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを3週間間隔で4回点滴静注する。その後、ニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。

〈再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫〉 通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。

通常、小児にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回3mg/kg(体重)を2週間間隔で点滴静注する。なお、体重40kg以上の小児には、ニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注することもできる。

〈再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌、原発不明癌〉 通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。

〈切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫〉 通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。

イピリムマブ(遺伝子組換え)と併用する場合は、通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回360mgを3週間間隔で点滴静注する。

イピリムマブ(遺伝子組換え)と併用する場合は、通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを3週間間隔で4回点滴静注する。その後、ニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。

〈根治切除不能な進行・再発の食道癌〉 通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。

他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合は、通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔、1回360mgを3週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。

〈食道癌における術後補助療法、尿路上皮癌における術後補助療法〉 通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。ただし、投与期間は12ヵ月間までとする。

7. 用法及び用量に関連する注意

〈効能共通〉

7. 1 本剤は、30分以上かけて点滴静注すること。

〈悪性黒色腫〉

7. 2 根治切除不能な悪性黒色腫に対して、イビリムマブ(遺伝子組換え)と併用する場合は、臨床試験に組み入れられた患者の前治療歴等について、「17.臨床成績」の項目の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、併用の必要性について慎重に判断すること。また、イビリムマブ(遺伝子組換え)の上乗せによる延命効果は、PD-L1を発現した腫瘍細胞が占める割合(PD-L1発現率)により異なる傾向が示唆されている。イビリムマブ(遺伝子組換え)との併用投与に際してPD-L1発現率の測定結果が得られ、PD-L1発現率が高いことが確認された患者においては、本剤単独投与の実施についても十分検討した上で、慎重に判断すること。[17.1.6参考] 〈切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌〉

7. 3 化学療法未治療患者に対する本剤単独投与の有効性及び安全性は確立していない。

7. 4 他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合、併用する他の抗悪性腫瘍剤は、「17.臨床成績」の項目の内容を熟知し、臨床試験において検討された患者のPD-L1発現率を考慮した上で選択すること。[17.1.10参考]

〈根治切除不能又は転移性の腫瘍細胞癌〉

7. 5 化学療法未治療患者及びサイトカイン製剤のみの治療歴を有する患者に対する本剤単独投与の有効性及び安全性は確立していない。

〈再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫〉

7. 6 他の抗悪性腫瘍剤との併用について、有効性及び安全性は確立していない。

〈再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌〉

7. 7 他の抗悪性腫瘍剤との併用について、有効性及び安全性は確立していない。

〈治療切除不能な進行・再発の胃癌〉

7. 8 本剤単独投与の一次治療及び二次治療における有効性及び安全性は確立していない。

7. 9 他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合には、HER2陰性の患者に投与すること。

7. 10 他の抗悪性腫瘍剤との併用投与の有効性は、PD-L1発現率(CPS)により異なる傾向が示唆されている。CPSについて、「17.臨床成績」の項目の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、本剤を併用する必要性について慎重に判断すること。[17.1.20参考]

7. 11 他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合、併用する他の抗悪性腫瘍剤は「17.臨床成績」の項目の内容を熟知し選択すること。[17.1.20, 17.1.21参考]

〈切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫〉

7. 12 化学療法未治療患者に対する本剤単独投与の有効性及び安全性は確立していない。

〈根治切除不能な進行・再発の食道癌〉

7. 13 化学療法未治療患者に対する本剤単独投与の有効性及び安全性は確立していない。

7. 14 他の抗悪性腫瘍剤との併用投与の有効性は、PD-L1発現率(TPS)により異なる傾向が示唆されている。TPSについて、「17.臨床成績」の項目の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、本剤を含む併用療法の必要性について慎重に判断すること。[17.1.26参考]

7. 15 他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合、併用する他の抗悪性腫瘍剤は「17.臨床成績」の項目の内容を熟知した上で、選択すること。[17.1.26参考]

〈食道癌における術後補助療法〉

7. 16 他の抗悪性腫瘍剤との併用について、有効性及び安全性は確立していない。

〈原発不明癌〉

7. 17 他の抗悪性腫瘍剤との併用について、有効性及び安全性は確立していない。

〈尿路上皮癌における術後補助療法〉

7. 18 他の抗悪性腫瘍剤との併用について、有効性及び安全性は確立していない。

8. 重要な基本的注意

〈効能共通〉

8. 1 本剤のT細胞活性化作用により、過度の免疫反応に起因すると考えられる様々な疾患や病態があらわれることがある。観察を十分に行い、異常が認められた場合には、過度の免疫反応による副作用の発現を考慮し、適切な鑑別診断を行うこと。過度の免疫反応による副作用が疑われる場合には、副腎皮質ホルモン剤の投与等を考慮すること。また、本剤投与終了後に重篤な副作用があらわれることがあるので、本剤投与終了後も観察を十分に行うこと。

8. 2 12間質性肺疾患があらわれることがあるので、臨床症状(呼吸困難、咳嗽、発熱、肺音の異常(捻髪音)等)の確認及び胸部X線検査の実施等、観察を十分に行うこと。また、必要に応じて胸部CT、血清マーカー等の検査を実施すること。[1.2, 9.1.2, 11.1.1参考]

8. 3 重症筋無力症、心筋炎、筋炎、横紋筋融解症があらわれることがあるので、筋力低下、眼瞼下垂、呼吸困難、嚥下障害、CK上昇、心電図異常、血中及び尿中ミオグロビン上昇等の観察を十分に行うこと。[11.1.2参考]

8. 4 1型糖尿病があらわれることがあるので、口渴、恶心、嘔吐等の症状の発現や血糖値の上昇に十分注意すること。[11.1.4参考]

8. 5 創症肝炎、肝不全、肝機能障害、肝炎、硬化性胆管炎があらわれることがあるので、定期的に肝機能検査を行い、患者の状態を十分に観察すること。[11.1.6参考]

8. 6 甲状腺機能障害、下垂体機能障害及び副腎障害があらわれることがあるので、本剤の投与開始前及び投与期間中は定期的に内分泌機能検査(TSH、遊離T3、遊離T4、ACTH、血中コルチゾール等の測定)を実施すること。また、必要に応じて画像検査等の実施も考慮すること。[11.1.7, 11.1.8, 11.1.11参考]

8. 7 腎障害があらわれることがあるので、定期的に腎機能検査を行い、患者の状態を十分に観察すること。[11.1.10参考]

8. 8 Infusion reactionがあらわれることがあるので、本剤の投与は重度のInfusion reactionに備えて緊急時に十分な対応のできる準備を行った上で開始すること。また、2回目以降の本剤投与時にInfusion reactionがあらわれることもあるので、本剤投与中及び本剤投与終了後はバイタルサインを測定するなど、患者の状態を十分に観察すること。[11.1.15参考]

*8. 9 ぶどう膜炎があらわれることがあるので、眼の異常の有無を定期的に確認すること。また、眼の異常が認められた場合には、速やかに医療機関を受診するよう患者を指導すること。[11.1.20参考]

〈切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌〉

8. 10 本剤とカルボプラチナ、パクリタキセル及びベバシズマブ(遺伝子組換え)を併用投与する際には、発熱性好中球減少症があらわれることがあるので、必要に応じて血液検査を行う等、患者の状態を十分に観察すること。[11.1.5参考]

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9. 1 合併症・既往歴のある患者

9. 1. 1 自己免疫疾患の合併又は慢性的若しくは再発性の自己免疫疾患の既往歴のある患者 自己免疫疾患が増悪するおそれがある。

9. 1. 2 間質性肺疾患のある患者又はその既往歴のある患者 間質性肺疾患が増悪するおそれがある。[1.2, 8.2, 11.1.1参考]

9. 1. 3 臨器移植歴(造血幹細胞移植歴を含む)のある患者 本剤の投与により移植臓器に対する拒絶反応又は移植片対宿主病が発現するおそれがある。

9. 1. 4 結核の感染又は既往を有する患者 結核を発症するおそれがある。[11.1.17参考]

9. 4 生殖能を有する者 妊娠する可能性のある女性には、本剤投与中及び投与終了後一定期間は適切な避妊法を用いるよう指導すること。[9.5参考]

9. 5 妊婦 妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。妊娠サル用いた出生前及び出生後の発生に関する試験において、10mg/kgの週2回投与(AUC比較で臨床曝露量の約6倍に相当する)により妊娠末期における胚・胎児死亡率あるいは出生児死亡率の増加が認められたが、奇形性は認められなかった。また、出生児の成長及び発達に影響は認められなかった。なお、本剤は出生児の血清中で認められている。[9.4参考]

9. 6 授乳婦 治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。本剤のヒト乳汁中への移行は検討されていないが、ヒトIgGは乳汁中に移行するので、本剤も移行する可能性がある。

9. 7 小児等

〈悪性黒色腫、切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌、根治切除不能又は転移性の腫瘍細胞癌、再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌、治療切除不能な進行・再発の胃癌、切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫、がん化学療法後に増悪した治療切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する結腸・直腸癌、根治切除不能な進行・再発の食道癌、食道癌における術後補助療法、原発不明癌、尿路上皮癌における術後補助療法〉

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

〈再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫〉

低出生体重児、新生児又は乳児を対象とした臨床試験は実施していない。

9. 8 高齢者 患者の状態を十分に観察しながら慎重に投与すること。一般に生理機能が低下している。

10. 相互作用

10. 2 併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
生ワクチン 弱毒生ワクチン 不活化ワクチン	接種したワクチンに対する過度な免疫応答に基づく症状が発現した場合には適切な処置を行うこと。	本剤のT細胞活性化作用による過度の免疫反応が起こるおそれがある。

11. 副作用 次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど、適切な処置を行ふこと。

11. 1 重大な副作用

11. 1. 1 間質性肺疾患 肺臓炎、肺浸潤、肺障害等の間質性肺疾患(3.6%、6.2%)があらわれることがあるので、異常が認められた場合には、速やかに胸部X線、胸部CT、血清マーカー等の検査を実施すること。[1.2, 8.2, 9.1.2参考]

11. 1. 2 重症筋無力症(0.1%未満、0.1%未満)、心筋炎(0.2%、0.2%)、筋炎(0.1%未満、0.3%)、横紋筋融解症(頻度不明、0.1%未満)これらを合併したと考えられる症例も報告されている。また、重症筋無力症によるクリーゼのため急速に呼吸不全が進行することがあるので、呼吸状態の悪化に十分注意すること。[8.3参考]

11. 1. 3 大腸炎(1.2%、3.2%)、小腸炎(0.1%未満、0.2%)、重度の下痢(0.8%、3.6%)腸炎から穿孔、イレウスに至る例が報告されている。持続する下痢、腹痛、血便等の症状があらわれた場合には、投与を中止するなど、適切な処置を行ふこと。

11. 1. 4 1型糖尿病 1型糖尿病(劇症1型糖尿病を含む)(0.2%、0.5%)があらわれ、糖尿病性ケトアシドーシスに至ることがある。1型糖尿病が疑わされた場合には投与を中止し、インスリン製剤の投与等の適切な処置を行うこと。[8.4参考]

11. 1. 5 重篤な血液障害 免疫性血小板減少性紫斑病(頻度不明、0.1%未満)、溶血性貧血(頻度不明、0.1%未満)、無顆粒球症(頻度不明、頻度不明)、発熱性好中球減少症(0.1%未満、1.8%)等の重篤な血液障害があらわれることがある。また、本剤とカルボプラチナ、パクリタキセル及びベバシズマブ(遺伝子組換え)との併用において、発熱性好中球減少症(15.8%注)があらわれることがある。[8.10参考]
注1)発現頻度はONO-4538-52試験から集計した。

11. 1. 6 劇症肝炎、肝不全、肝機能障害、肝炎、硬化性胆管炎 劇症肝炎(頻度不明、頻度不明)肝不全(0.1%未満、0.1%未満)、AST増加、ALT増加、γ-GTP増加、AlP増加、ビリルビン増加等を伴う肝機能障害(0.9%、4.3%)、肝炎(0.3%、1.6%)、硬化性胆管炎(頻度不明、頻度不明)があらわれることがある。[8.5参考]

11. 1. 7 甲状腺機能障害 甲状腺機能低下症(7.6%、12.8%)、甲状腺機能亢進症(3.8%、6.4%)、甲状腺炎(0.9%、1.4%)等の甲状腺機能障害があらわれることがある。[8.6参考]

11. 1. 8 下垂体機能障害 下垂体炎(0.3%、2.0%)、下垂体機能低下症(0.2%、1.0%)、副腎皮質刺激ホルモン欠損症(0.1%未満、0.1%)等の下垂体機能障害があらわれることがある。[8.6参考]

11. 1. 9 神經障害 末梢性ニューロパシー(1.3%、18.8%)、多発ニューロパシー(0.1%未満、0.3%)、自己免疫性ニューロパシー(0.1%未満、頻度不明)、ギラン・バレー症候群(0.1%未満、0.1%未満)、脱髓(0.1%未満、頻度不明)等の神經障害があらわれることがある。

11. 1. 10 腎障害 腎不全(0.6%、2.0%)、尿細管間質性腎炎(0.1%、0.1%)、糸球体腎炎(頻度不明、0.1%未満)等の腎障害があらわれることがある。[8.7参考]

11. 1. 11 副腎障害 副腎機能不全(0.6%、3.1%)等の副腎障害があらわれることがある。[8.6参考]

11. 1. 12 脳炎(0.1%未満、0.2%)

11. 1. 13 重度の皮膚障害 中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis:TEN)(頻度不明、0.1%未満)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)(0.1%未満、0.1%未満)、類人疱瘡(0.1%未満、0.1%未満)、多形紅斑(0.2%、0.4%)等の重度の皮膚障害があらわれることがある。

11. 1. 14 静脈血栓塞栓症 深部静脈血栓症(0.1%未満、0.4%)、肺塞栓症(0.1%未満、0.4%)等の静脈血栓塞栓症があらわれることがある。

11. 1. 15 Infusion reaction アナフィラキシー、発熱、悪寒、そう痒症、発疹、高血圧、低血圧、呼吸困難、過敏症等を含むInfusion reaction(3.2%、7.0%)があらわれることがある。重度のInfusion reactionがあらわれた場合には直ちに投与を中止して適切な処置を行うとともに、全ての徴候及び症状が完全に回復するまで患者の状態を十分に観察すること。[8.8参考]

11. 1. 16 血球貪食症候群(頻度不明、頻度不明)

11. 1. 17 結核(頻度不明、頻度不明) [9.1.4参考]

11.1.18 膜炎(0.3%、0.7%)

11.1.19 重度の胃炎 免疫反応に起因すると考えられる重度の胃炎(頻度不明、頻度不明)があらわれることがある。異常が認められた場合には、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。

*11.1.20 ぶどう膜炎(0.3%、0.3%) [8.9参考]

注)「重大な副作用」の発現頻度は、単独投与時、併用投与時の順に記載した。

11.2 その他の副作用

11.2.1 単独投与

	5%以上	1~5%未満	1%未満	頻度不明
血液及びリンパ系障害	貧血、リンパ球減少症、白血球減少症、血小板減少症、好中球減少症	リンパ節症、赤血球数減少、ヘマトクリット減少、白血球增加症、好中球数増加、单球数增加、好酸球增加、ヘモグロビン減少	单球数減少、好酸球数減少	
* 心臓障害		徐脈、心房細動、心室性期外収縮、頻脈、動悸、伝導障害、不整脈、心電図QT延長	心肥大、心不全、急性心不全、心膜炎	
耳及び迷路障害		回転性めまい、耳不快感、難聴		
内分泌障害	高リバーゼ血症	尿中ブドウ糖陽性、抗甲状腺抗体陽性		
* 眼障害		眼乾燥、硝子体浮遊物、流涙增加、霧視、視力障害、複視、角膜障害	フォークト・小柳・原田病	
胃腸障害	下痢、恶心	腹痛、口内乾燥、口内炎、嘔吐、便秘	消化不良、腹部不快感、腹部膨満、腹水、胃潰瘍、胃炎、十二指腸潰瘍、口の感覺鈍麻、口唇炎、胃食道逆流性疾患、放屁、口腔障害、歯肉出血、歯周病、流涎過多、胃腸障害、口腔知覚不全、消化管出血	
全身障害	疲労(19.7%)、無力感	倦怠感、悪寒、浮腫、粘膜の炎症、発熱、インフルエンザ様疾患	口渴、顔面浮腫、注射部位反応、腫脹、胸部不快感、全身健康状態低下、疼痛、胸痛	
免疫系障害			リウマチ因子増加、抗核抗体増加、補体因子増加、抗リン脂質抗体陽性、サルコイドーシス	リウマチ因子陽性、インフルエンザ様疾患
感染症			癰、気管支炎、気道感染、蜂巣炎、爪感染、外耳炎、中耳炎、歯周炎、歯肉炎、鼻咽頭炎、膿疱性皮疹、帶状疱疹、尿路感染、肺感染	
代謝及び栄養障害	食欲減退	高血糖、低ナトリウム血症、高アミラーゼ血症	糖尿病、脱水、高尿酸血症、高カリウム血症、低カリウム血症、低マグネシウム血症、低リン酸血症、低アルブミン血症、高コレステロール血症、高トリグリセリド血症、脂質異常症、血中リン増加、低クロール血症、高マグネシウム血症	代謝性アシドーシス、総蛋白減少
筋骨格系及び結合組織障害	関節痛	筋肉痛	四肢痛、背部痛、筋固縮、筋力低下、側腹部痛、筋骨格硬直、リウマチ性多発筋痛、関節炎、筋骨格痛、関節腫脹、開口障害、筋縮症、シェーゲレン症候群、頸部痛、腱炎、関節硬直	
精神・神経系障害		味覚異常、浮動性めまい、頭痛	不眠症、傾眠、記憶障害、感觉鈍麻、不安、感情障害、リドー減退、うつ病、錯覚	
腎及び尿路障害		高クレアチニン血症	尿中蛋白尿、血尿、血中尿素增加、尿沈渣異常	尿沈渣異常
呼吸器、胸郭及び縫隔障害		呼吸困難、咳嗽	咳嗽、呼吸困難、しゃべり、鼻出血、发声障害	喉頭浮腫
皮膚及び皮下組織障害	そう痒症、発疹	皮膚乾燥、紅斑、ざ瘡様皮膚炎、丘疹性皮疹、湿疹、尋常性白斑、脱毛症、皮膚炎	皮膚炎、皮膚病変、紅斑、ざ瘡、ざ瘡様皮膚炎、尋常性皮疹、脱毛症、手足症候群	白斑、中毒性皮疹、乾癬、皮膚色素減少、毛髮変色、苔癭様角化症、爪の障害、皮膚腫瘍、紫斑、湿疹、寝汗、多汗症、尋常性白斑
血管障害			潮紅、ほてり、高血圧、低血圧、血管炎	潮紅、ほてり、血管炎、血栓症、低血圧
その他		体重減少	血中CK増加、CRP増加、血中CK増加、体重増加、血中LDH増加、CRP増加、体重増加、血中CK増加、組織球性壞死性リバム炎	血中CK減少、硬膜下血腫、真珠腫、血管出血、組織球性壞死性リバム炎

11.2.2 併用投与

	5%以上	1~5%未満	1%未満	頻度不明
血液及びリンパ系障害	好中球減少症(19.5%)、貧血(15.2%)、血小板減少症、白血球減少症	リンパ球減少症	リンパ節症、白血球增加症、好酸球增加症、ヘマトクリット減少、单球增加症、好酸球減少症、好中球増加症、ヘモグロビン減少、赤血球減少症	单球数減少
心臓障害			頻脈、不整脈、心不全、心房細動、徐脈、動悸、心電図QT延長	心肥大、急性心不全、心室性期外収縮、伝導障害
耳及び迷路障害			回転性めまい、難聴、耳鳴、耳不快感	
内分泌障害			性腺機能低下、副甲状腺機能低下症、尿中ブドウ糖陽性	抗甲状腺抗体陽性
* 眼障害		眼乾燥	霧視、視力障害、硝子体浮遊物、複視、角膜障害、上強膜炎、流涙增加、フォークト・小柳・原田病	
胃腸障害	恶心(27.4%)、下痢(26.9%)、嘔吐、便秘、口内炎、腹痛	消化不良、口内乾燥	腹部膨満、腹部不快感、胃炎、放屁、胃腸障害、口腔知覚不全、口腔障害、腹水、腸管穿孔、口唇炎、歯周病、十二指腸炎、十二指腸潰瘍、消化管出血、歯肉出血、口腔内痛、舌痛、痔核、胃食道逆流性疾患、流涎過多、口の感覺鈍麻	胃潰瘍

●その他、詳細は電子添文をご参照ください。

●電子添文の改訂に十分ご留意ください。

全身障害	疲労(21.8%)、発熱、無力感、倦怠感	浮腫、粘膜の炎症、悪寒、インフルエンザ様疾患	顔面浮腫、口渴、疼痛、注射部位反応、腫脹、胸部不快感、全身健康状態低下、胸痛	
免疫系障害			リウマチ因子増加、サルコイドーシス	リウマチ因子陽性、抗核抗体増加、補体因子増加、抗リン脂質抗体陽性、インターロイキン濃度増加
感染症		肺感染		癰、外耳炎
代謝及び栄養障害	食欲減退(20.9%)、高リバーゼ血症、高アミラーゼ血症	高血糖、低ナトリウム血症、脱水、低カリウム血症、低アルブミン血症、低マグネシウム血症、低リソチウム血症、低カルシウム血症	糖尿病、高カリウム血症、高コレステロール血症、高ナトリウム血症、高トリグリセリド血症、高尿酸血症、脂質異常症、低クロール血症、代謝性アシドーシス、高カリウム血症、総蛋白減少	高マグネシウム血症、血中リノ増加
筋骨格系及び結合組織障害	関節痛	関節炎、背部痛、四肢痛、筋痙攣、筋肉痛	筋骨格痛、筋骨格硬直、関節腫脹、頸部痛、脊椎関節障害、側腹部痛、筋固縮、関節硬直、リウマチ性多発筋痛、腱炎、頸骨壊死、開口障害、筋力低下	シェーゲレン症候群
精神・神経系障害	味覚異常	浮動性めまい、錯覚、不眠症、頭痛、感觉鈍麻	失神、不安、うつ病、傾眠、嗜睡、記憶障害、感情障害、リビドー減退、神経炎、錯乱状態、腓骨神経麻痺	
腎及び尿路障害		血中クレアチニン增加、蛋白尿	頻尿、血尿、血中尿素增加、膀胱炎	尿沈渣異常
呼吸器、胸郭及び縫隔障害		咳嗽、呼吸困難、しゃべり、鼻出血、发声障害	肺出血、気道の炎症、胸水、喉頭痛、アレルギー性鼻炎、喘鳴、鼻漏、鼻閉、咯血、低酸素症、サーファクトントプロテイン増加、口腔咽頭痛	喉頭浮腫
皮膚及び皮下組織障害	発疹(18.1%)、そよ痒症(17.1%)、丘疹性皮疹、脱毛症、手足症候群	皮膚炎、皮膚病変、紅斑、ざ瘡、ざ瘡様皮膚炎、尋常性皮疹、皮膚乾燥、皮膚色素過剩	白斑、中毒性皮疹、乾癬、皮膚色素減少、毛髮変色、苔癭様角化症、爪の障害、皮膚腫瘍、紫斑、湿疹、寝汗、多汗症、尋常性白斑	酒さ
血管障害		高血圧	潮紅、ほてり、血管炎、血栓症、低血圧	
その他	体重減少		血中LDH増加、CRP増加、血中CK増加、体重増加、細胞マーカー増加、腫瘍、乳頭痛	血中CK減少、硬膜下血腫、真珠腫、血管出血、組織球性壞死性リバム炎

14. 適用上の注意

14.1 薬剤調製時の注意

14.1.1 バイアルは振盪せず、激しく攪拌しないこと。

14.1.2 本剤は日局生理食塩液又は5%ブドウ糖注射液に希釈する。なお、1回240mg、360mg又は480mg投与時の総液量は体重30kg以上の患者には150mL以下、体重30kg未満の患者には100mL以下とする。

3mg/kg投与時は最終濃度が0.35mg/mL以上となるように希釈する。

14.1.3 添加後は静かに混和し、急激な振盪は避けること。

14.1.4 希釈後の液は速やかに使用すること。また、使用後も残液は、細菌汚染のおそれがあるので使用しないこと。

14.1.5 希釈後の最終濃度0.35mg/mL未満では、本剤の点滴溶液中の安定性が確認されていない。

14.1.6 他剤との混注はしないこと。

14.2 薬剤投与時の注意 本剤の投与にあたっては、インラインフィルター(0.2又は0.22μm)を使用すること。

15. その他の注意

15.1 臨床使用に基づく情報

15.1.1 国内外において本剤に対する抗体の産生が報告されている。

15.1.2 海外臨床試験において、本剤による治療後に同種造血幹細胞移植が実施された症例で、重篤な移植片対宿主病等の移植関連合併症が認められた。

15.2 非臨床試験に基づく情報 サルに本剤50mg/kgを週1回、4週間反復投与した結果、脈絡叢へのリンパ球及び形質細胞浸潤が認められたとの報告がある。

20. 取扱い上の注意 外箱開封後は遮光して保存すること。

21. 承認条件

〈悪性黒色腫、切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌、根治切除不能又は転移性の腎細胞癌、再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫、再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌、治癒切除不能な進行・再発の胃癌、切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫、がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する結腸・直腸癌、がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発の食道癌、食道癌における術後補助療法、原発不明癌〉

21.1 医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。

〈再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫〉

21.2 国内での治験症例が極めて限られていることから、製造販売後、一定数の症例に係るデータが集積されるまでの間は、全症例を対象に使用成績調査を実施することにより、本剤使用患者の背景情報を把握するとともに、本剤の安全性及び有効性に関するデータを早期に収集し、本剤の適正使用に必要な措置を講じること。

22. 包装

〈オブジーボ点滴静注20mg〉 2mL[1バイアル]

〈オブジーボ点滴静注100mg〉 10mL[1バイアル]

〈オブジーボ点滴静注120mg〉 12mL[1バイアル]

〈オブジーボ点滴静注240mg〉 24mL[1バイアル]

プロモーション提携

ブリストル・マイヤーズ スクワイブ株式会社

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-2-1

文献請求及び当社製品情報に関するお問い合わせ先 電話 0120-093-507

販売情報提供活動に関するお問い合わせ先 電話 0120-487-200

* 2022年10月改訂

●その他、詳細は電子添文をご参照ください。

●電子添文の改訂に十分ご留意ください。

製造販売

小野薬品工業株式会社

〒541-8564 大阪市中央区久太郎町1-8-2

文献請求及び当社製品情報に関するお問い合わせ先

販売情報提供活動に関するお問い合わせ先

電話 0120-626-190

電話 0120-076-108



貯 法：凍結を避け、2~8°Cで保存

有効期間：24箇月

点滴静注液 20mg, 50mg

薬価基準収載

ヤーボイ点滴静注液20mg	ヤーボイ点滴静注液50mg
承認番号	30300AMX00428000
販売開始	2021年11月
薬価収載	2021年11月

1. 警告

- 1.1 本剤は、緊急時に十分対応できる医療施設において、がん化学療法に十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本剤の使用が適切と判断される症例についてのみ投与すること。また、治療開始に先立ち、患者又はその家族に有効性及び危険性を十分説明し、同意を得てから投与すること。
- 1.2 本剤投与により、重篤な下痢、大腸炎、消化管穿孔があらわれることがあり、本剤の投与終了から数カ月後に発現し、死亡に至った例も報告されている。投与中だけでなく、投与終了後も観察を十分に行い、異常が認められた場合には、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。[8.2、11.1.1、11.1.2参照]

2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)

本剤の成分に対し重度の過敏症の既往歴のある患者

商品名	〔和 名〕ヤーボイ点滴静注液 20mg ヤーボイ点滴静注液 50mg
一般名	〔洋 名〕YERVOY® Injection イピリムマブ(遺伝子組換え) Ipilimumab(Genetical Recombination)

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	ヤーボイ点滴静注液 20mg	ヤーボイ点滴静注液 50mg
成分	1バイアル中の分量	
	4mL	10mL
有効成分	イピリムマブ(遺伝子組換え)	20mg 50mg
添加剤	トロメタモール塩酸塩 塩化ナトリウム D-マンニトール ジエチレントリアミン五酢酸 ポリソルベート80 その他pH調節剤を含有する。	12.6mg 23.4mg 40mg 0.16mg 0.44mg 31.5mg 58.4mg 100mg 0.39mg 1.10mg

本剤はチャイニーズハムスター卵巣細胞を用いて製造される。

3.2 製剤の性状

販売名	ヤーボイ点滴静注液20mg	ヤーボイ点滴静注液50mg
外観	無色～微黄色の澄明又はわずかに乳白光を呈する液で、微粒子をわずかに認めることがある。	
pH	6.6~7.6	
浸透圧比(生理食塩液に対する比)	約1	

4. 効能又は効果

- 根治切除不能な悪性黒色腫
○根治切除不能又は転移性の腎細胞癌
○がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する結腸・直腸癌
○切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌
○切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫
○根治切除不能な進行・再発の食道癌

5. 効能又は効果に関する注意

<根治切除不能な悪性黒色腫>

5.1 本剤の術後補助療法における有効性及び安全性は確立していない。

5.2 「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。特に、化学療法未治療の根治切除不能な悪性黒色腫患者への本剤単独投与に際しては、他の治療の実施についても慎重に検討すること。
[17.1.1-17.1.4参照]

<根治切除不能又は転移性の腎細胞癌>

5.3 本剤の術後補助療法における有効性及び安全性は確立していない。

5.4 IMDC^(注1)リスク分類がintermediate又はpoorリスクの患者を対象とすること。5.5 「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。
[17.1.5参照]

注1) International Metastatic RCC Database Consortium

<がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する結腸・直腸癌>

5.6 本剤の術後補助療法における有効性及び安全性は確立していない。

5.7 フッ化ビリミン系抗悪性腫瘍剤、オキサリプラチン及びイリノテカン塩酸塩水和物による治療歴のない患者における本剤の有効性及び安全性は確立していない。

5.8 十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、MSI-Highが確認された患者に投与すること。検査にあたっては、ニボルマブ(遺伝子組換え)のMSI-Highを有する結腸・直腸癌患者への適応判定の補助目的として承認された体外診断用医薬品又は医療機器を用いること。なお、承認された体外診断用医薬品又は医療機器に関する情報については、以下のウェブサイトから入手可能である:

<https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/review-information/cd/0001.html>5.9 「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、本剤以外の治療の実施についても慎重に検討し、適応患者の選択を行うこと。
[17.1.6参照]

<切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌>

5.10 本剤の術後補助療法における有効性及び安全性は確立していない。

5.11 臨床試験に組み入れられた患者のEGFR遺伝子変異又はALK融合遺伝子の有無等について、「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。
[17.1.7、17.1.8参照]

<切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫>

5.12 本剤の手術の補助療法における有効性及び安全性は確立していない。

<根治切除不能な進行・再発の食道癌>

5.13 本剤の手術の補助療法における有効性及び安全性は確立していない。

5.14 「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。
[17.1.10参照]

6. 用法及び用量

<根治切除不能な悪性黒色腫>

通常、成人にはイピリムマブ(遺伝子組換え)として1回3mg/kg(体重)を3週間間隔で4回点滴静注する。なお、他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合は、ニボルマブ(遺伝子組換え)と併用すること。

<根治切除不能又は転移性の腎細胞癌、がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する結腸・直腸癌>

ニボルマブ(遺伝子組換え)との併用において、通常、成人にはイピリムマブ(遺伝子組換え)として1回1mg/kg(体重)を3週間間隔で4回点滴静注する。

<切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌>

他の抗悪性腫瘍剤との併用において、通常、成人にはイピリムマブ(遺伝子組換え)として1回1mg/kg(体重)を6週間間隔で点滴静注する。

<切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫、根治切除不能な進行・再発の食道癌>

ニボルマブ(遺伝子組換え)との併用において、通常、成人にはイピリムマブ(遺伝子組換え)として1回1mg/kg(体重)を6週間間隔で点滴静注する。

7. 用法及び用量に関する注意

<効能共通>

7.1 副作用が発現した場合には、下記の基準を参考に本剤の投与を延期又は中止すること。

投与延期及び中止の基準

副作用	処置
・Grade 2の副作用(内分泌障害及び皮膚障害を除く) ・Grade 3の皮膚障害 ・症候性の内分泌障害	Grade 1以下又はベースラインに回復するまで投与を延期する。内分泌障害については、症状が回復するまで投与を延期する。 上記基準まで回復しない場合は、投与を中止する。
・Grade 3以上の副作用(内分泌障害及び皮膚障害を除く) ・局所的な免疫抑制療法が有効でないGrade 2以上の眼障害 ・Grade 4の皮膚障害	投与を中止する。

GradeはNCI-CTCAE(Common Terminology Criteria for Adverse Events)ver.4.0に準じる。

7.2 本剤は、30分かけて点滴静注すること。

<根治切除不能な悪性黒色腫>

7.3 ニボルマブ(遺伝子組換え)と併用する場合は、臨床試験に組み入れられた患者の前治療歴等について、「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、併用の必要性について慎重に判断すること。また、本剤のニボルマブ(遺伝子組換え)への上乗せによる延命効果は、PD-L1を発見した腫瘍細胞が占

める割合(PD-L1発現率)により異なる傾向が示唆されている。ニボルマブ(遺伝子組換え)との併用投与に際してPD-L1発現率の測定結果が得られ、PD-L1発現率が高いことが確認された患者においては、ニボルマブ(遺伝子組換え)単独投与の実施についても十分検討した上で、慎重に判断すること。[17.1.1-17.1.4参照]

〈切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌〉

7.4 ニボルマブ(遺伝子組換え)を含む他の抗悪性腫瘍剤との併用により投与すること。

併用する他の抗悪性腫瘍剤は、「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、臨床試験において検討された患者のPD-L1発現率を考慮した上で選択すること。[17.1.7、17.1.8参照]

〈根治切除不能な進行・再発の食道癌〉

7.5 ニボルマブ(遺伝子組換え)との併用投与の有効性は、PD-L1発現率(TPS)により異なる傾向が示唆されている。TPSについて、「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、ニボルマブ(遺伝子組換え)との併用療法の必要性について慎重に判断すること。[17.1.10参照]

8. 重要な基本的注意

8.1 本剤のT細胞活性化作用により、過度の免疫反応に起因すると考えられる様々な疾患や病態があらわれることがある。観察を十分に行い、異常が認められた場合には、過度の免疫反応による副作用の発現を考慮し、適切な鑑別診断を行うこと。過度の免疫反応による副作用が疑われる場合には、副腎皮質ホルモン剤の投与等を考慮すること。

8.2 本剤投与終了から数ヵ月後に重篤な副作用(下痢、大腸炎、下垂体機能低下症等)があらわれることがあり、死亡に至った例も報告されているので、本剤投与終了後も観察を十分に行い、異常が認められた場合は、適切な処置を行うこと。[1.2参照]

8.3 肝不全、肝機能障害があらわれることがあるので、定期的に肝機能検査を行い、患者の状態を十分に確認すること。[11.1.3参照]

8.4 下垂体炎、下垂体機能低下症、甲状腺機能低下症、副腎機能不全があらわれることがあるので、定期的に内分泌機能検査(TSH、遊離T3、遊離T4、ACTH、血中コルチゾール等の測定)を行い、患者の状態を十分に確認すること。また、必要に応じて画像検査等の実施も考慮すること。[11.1.5参照]

8.5 筋炎があらわれることがあるので、筋力低下、筋肉痛、CK上昇等の観察を十分に行うこと。[11.1.9参照]

8.6 心筋炎があらわれることがあるので、胸痛、CK上昇、心電図異常等の観察を十分に行うこと。[11.1.10参照]

**8.7 ぶどう膜炎があらわれることがあるので、眼の異常の有無を定期的に確認すること。また、眼の異常が認められた場合には、速やかに医療機関を受診するよう患者を指導すること。[11.1.12参照]

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.1 合併症・既往歴等のある患者

9.1.1 自己免疫疾患の合併又は慢性的若しくは再発性の自己免疫疾患の既往歴のある患者

自己免疫疾患が増悪するおそれがある。

9.1.2 臓器移植歴(造血幹細胞移植歴を含む)のある患者

本剤の投与により移植臓器に対する拒絶反応が発現するおそれがある。

9.3 肝機能障害患者

9.3.1 重度の肝機能障害のある患者

重度の肝機能障害のある患者を対象とした臨床試験は実施していない。

9.4 生殖能を有する者

妊娠する可能性のある女性には、本剤投与中及び最終投与後一定期間は適切な避妊法を用いるよう指導すること。[9.5参照]

9.5 妊婦

妊娠又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。妊娠中に本剤を投与するか、本剤投与中の患者が妊娠した場合は、本剤投与による奇形性、流産等が生じる可能性があることについて、患者に十分説明すること。ヒトIgGは胎盤を通過することが報告されており、本剤は胎児へ移行する可能性がある。また、動物実験(サル)で器官形成期から分娩までの投与により、AUC比較で臨床曝露量の約8.3倍に相当する投与量で、泌尿生殖器系の奇形、早産、出生児低体重が認められ、AUC比較で臨床曝露量の約3.1倍に相当する投与量で、流産、死産、出生児の早期死亡等の発現頻度の増加が認められている。[9.4参照]

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。動物実験(サル)における妊娠期間中の投与で、乳汁中への移行が認められている。また、ヒトIgGはヒト乳汁中に移行するため、本剤も移行する可能性がある。

9.7 小児等

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

9.8 高齢者

患者の状態を確認しながら慎重に投与すること。一般に生理機能が低下していることが多い。

11. 副作用

次の副作用があらわれがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

11.1.1 大腸炎(6.6%、4.2%)、消化管穿孔(1.3%*、0.1%未満)

死亡に至った例も報告されている。また、消化管穿孔があらわれた後に敗血症があらわ

れた例も報告されている。[1.2参照]

11.1.2 重度の下痢(4.0%、3.6%)

[1.2参照]

11.1.3 肝不全、肝機能障害

肝不全(0.7%、頻度不明)、ALT上昇(3.3%、10.1%)、AST上昇(2.6%、9.9%)等を伴う肝機能障害があらわれることがあり、死亡に至った例も報告されている。[8.3参照]

11.1.4 重度の皮膚障害

中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis; TEN)(0.3%*、頻度不明)、薬剤性過敏症症候群(いずれも頻度不明)等の重度の皮膚障害があらわれることがある。

11.1.5 下垂体炎(1.3%、3.4%)、下垂体機能低下症(2.0%、1.3%)、甲状腺機能低下症(1.3%、14.0%)、副腎機能不全(1.3%、4.1%)

異常が認められた場合には、本剤の投与延期、副腎皮質ホルモン剤の投与、ホルモン補充療法等の適切な処置を行うこと。[8.4参照]

11.1.6 末梢神経障害

ギラン・バレー症候群(0.3%*、0.1%未満)等の末梢神経障害があらわれることがあり、死亡に至った例も報告されている。

11.1.7 腎障害

腎不全(1.3%、1.9%)等の腎障害があらわれることがあり、死亡に至った例も報告されている。

11.1.8 間質性肺疾患

急性呼吸窮迫症候群(0.3%*、頻度不明)、肺臓炎(0.3%*、6.0%)、間質性肺疾患(頻度不明、0.9%)等があらわれることがあり、死亡に至った例も報告されている。

11.1.9 筋炎(頻度不明、0.4%)

[8.5参照]

11.1.10 心筋炎(頻度不明、0.2%)

[8.6参照]

11.1.11 Infusion reaction(0.7%、3.4%)

異常が認められた場合には、本剤の投与を中止する等の適切な処置を行ふとともに、症状が回復するまで患者の状態を十分に確認すること。

**11.1.12 ぶどう膜炎(1.3%、0.4%)

[8.7参照]

注)「重大な副作用」の発現頻度は、本剤単独投与時、併用投与時の順に記載した。

*:単独投与における海外第3相試験(MDX010-20試験)の本剤+gp100併用群での発現頻度

11.2 その他の副作用

11.2.1 単独投与

	5%以上	5%未満	頻度不明
皮膚	そう痒症(21.9%)、発疹	そう痒性皮疹、全身性皮疹、斑状丘疹状皮疹、紅斑、全身性そう痒症、尋常性白斑、脱毛症、寝汗	皮膚炎、湿疹、荨麻疹、皮膚剥脱、皮膚乾燥、白血球破碎性血管炎、毛髪変色
消化器	悪心、嘔吐、腹痛	腹部不快感、下腹部痛、便秘、放屁	胃腸出血、胃食道逆流性疾患、食道炎、腹膜炎、胃腸炎、憩室炎、脾炎、腸炎、胃潰瘍、大腸潰瘍、イレウス、リバーゼ上昇、血中アミラーゼ上昇、口内炎
内分泌		甲状腺機能亢進症	性腺機能低下、血中甲状腺刺激ホルモン上昇、血中コルチゾール減少、血中コルチコロビン減少、血中テストステロン減少、血中プロラクチン異常
肝臓		ALP上昇、血中ビリルビン上昇	肝炎、肝腫大、黄疸、γ-GTP上昇
腎臓			糸球体腎炎、腎尿細管性アシドーシス、血中クレアチニン上昇
呼吸器		咳嗽、呼吸困難	呼吸不全、肺浸潤、肺水腫、アレルギー性鼻炎
筋骨格系		関節痛、筋肉痛、背部痛、頸部痛	関節炎、筋骨格痛、筋痙攣、リウマチ性多発筋痛
全身投与部位	疲労(21.2%)、発熱	悪寒、無力症、倦怠感、浮腫、体重減少、インフルエンザ様疾患、局所腫脹、注射部位疼痛、注射部位反応	粘膜の炎症、疼痛、多臓器不全、全身性炎症反応症候群
代謝	食欲減退	脱水	腫瘍崩壊症候群、低カリウム血症、低ナトリウム血症、低リン酸血症、アルカローシス
眼		霧視	眼痛、硝子体出血、視力低下、結膜炎、眼の異物感、フォート・小柳・原田病

**

	5%以上	5%未満	頻度不明
神経系		頭痛、味覚異常	末梢性ニューロパチー、末梢性感覺ニューロパチー、浮動性めまい、嗜眠、失神、構語障害、脳浮腫、脳神経障害、運動失調、振戦、ミオクロース、重症筋無力症様症状、髄膜炎
精神			錯乱状態、精神状態変化、うつ病、リビドー減退
心・血管系		潮紅、低血圧、ほてり	血管炎、血管障害、末梢性虚血、起立性低血圧、不整脈、心房細動
血液		貧血	溶血性貧血、リンパ球減少症、好中球減少症、血小板減少症、好酸球増加症
感染症		感染	尿路感染、気道感染
生殖器			無月経

11.2.2併用投与

	5%以上	5%未満	頻度不明
皮膚	そう痒症(21.3%)、発疹(20.1%)、斑状丘疹状皮疹	脱毛症、皮膚炎、ざ瘡様皮膚炎、湿疹、紅斑、毛髪変色、多汗症、寝汗、紅斑性皮疹、斑状皮疹、丘疹性皮疹、そう痒性皮疹、皮膚色素減少、尋常性白斑、皮膚乾燥	
消化器	下痢(23.5%)、腹痛、便秘、恶心、嘔吐	口内乾燥、腹部不快感、消化不良、胃食道逆流性疾患、口内炎、肺炎、胃炎、腹部膨満、嚥下障害、十二指腸炎	
内分泌	甲状腺機能亢進症	甲状腺炎、血中甲状腺刺激ホルモン減少、血中甲状腺刺激ホルモン増加、自己免疫性甲状腺障害、副甲状腺機能低下症	
肝臓		肝炎、高ビリルビン血症、高トランジアミナーゼ血症、ALP上昇、γ-GTP上昇	
腎臓		血中クレアチニン上昇、尿細管間質性腎炎、腎炎	
呼吸器		咳嗽、口腔咽頭痛、胸水、发声障害、呼吸困難	
筋骨格系	関節痛	筋痙攣、筋力低下、四肢痛、筋骨格痛、脊椎関節障害、関節炎、背部痛、横紋筋融解症、関節硬直、壊死性筋炎、リウマチ性多発筋痛、ミオパチー、筋肉痛	シェーグレン症候群
全身投与部位	疲労(21.8%)、無力症、発熱	インフルエンザ様疾患、倦怠感、粘膜の炎症、疼痛、口渴、浮腫、胸痛、悪寒、体重減少、顔面浮腫	
代謝	食欲減退、高アミラーゼ血症、高リパーゼ血症	脱水、糖尿病、高血糖、低アルブミン血症、低カルシウム血症、低カリウム血症、低ナトリウム血症、高カリウム血症、低マグネシウム血症、低リン酸血症、糖尿病性ケアシドーシス	

	5%以上	5%未満	頻度不明
眼		眼乾燥、霧視、視力障害、上強膜炎	
神経系	頭痛	味覚不全、感覺鈍麻、嗜眠、末梢性ニューロパチー、錯覚、失神、多発ニューロパチー、神經炎、腓骨神經麻痺、脳炎、浮動性めまい、回転性めまい、重症筋無力症	自己免疫性ニューロパチー
精神		不安、うつ病、不眠症、錯乱状態	
心・血管系		頻脈、ほてり、高血圧、低血圧、不整脈、動悸、心房細動、徐脈	
血液	貧血	好酸球増加症、好中球減少症、血小板減少症、白血球減少症、リンパ球減少症	
感染症		結膜炎、肺炎、気道感染、気管支炎	
その他		過敏症、LDH上昇、CRP上昇、サルコイドーシス	

14. 適用上の注意

14.1 薬剤調製時の注意

14.1.1 本剤投与前に、溶液を目視により確認すること。本剤は半透明～白色の微粒子を認めることがあるが、微粒子はインラインフィルターにより除去される。なお、着色異物又は明らかな変色が認められる場合は使用しないこと。

14.1.2 本剤は、そのまま、もしくは生理食塩液又は5%ブドウ糖注射液を用いて1～4mg/mLの濃度に希釈し、投与すること。

14.1.3 用時調製し、調製後は速やかに使用すること。また、残液は廃棄すること。

14.2 薬剤投与時の注意

14.2.1 本剤は、0.2～1.2ミクロンのメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与すること。

14.2.2 本剤は、独立したラインにより投与すること。

15. その他の注意

15.1 臨床使用に基づく情報

15.1.1 海外及び国内の臨床試験において、本剤に対する抗体の産生が報告されている。

15.1.2 本剤とダカルバジンを併用投与した国内第2相試験において、重度の肝機能障害が高頻度に発現し、忍容性が認められなかった。また、本剤とペムラフェニブを併用投与した海外第1相試験において、重度の肝機能障害が高頻度に発現し、忍容性が認められなかった。

20. 取扱い上の注意

外箱開封後は遮光して保存すること。

21. 承認条件

医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。

22. 包装

〈ヤーボイ点滴静注液20mg〉

4mL[1バイアル]

〈ヤーボイ点滴静注液50mg〉

10mL[1バイアル]

プロモーション提携

小野薬品工業株式会社

〒541-8564 大阪市中央区久太郎町1-8-2

●文献請求及び当社製品情報に関するお問い合わせ先

電話.0120-626-190

●販売情報提供活動に関するお問い合わせ先

電話.0120-076-108

- 詳細は電子添文をご参照ください。
- 電子添文の改訂をご留意ください。

**2022年10月改訂(第10版)

*2022年7月改訂(第9版)

* 製造販売元

プリストル・マイヤーズ スカイプ 株式会社

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-2-1

●文献請求及び当社製品情報に関するお問い合わせ先

電話.0120-093-507

●販売情報提供活動に関するお問い合わせ先

電話.0120-487-200